DANZIGER
ANNUALS

Technical Product Pages

2024-2025



Deutsch

DANZIGER

ALONIA™

Angelonia angustifolia





ALONIA™ Purple

- Frühe Blüte
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Kann in kleinen Blumentöpfen gezüchtet werden, wächst aber schön und nimmt an Größe zu im Garten.
- Die fertige Pflanze hat eine Höhe und Breite von respektive
  36 cm x 30 cm (Alonia) und 41 cm x 36 cm (Alonia Blg)

Weitere Sorten der ALONIA™-Serie:



ALONIA™ Dark Lavender



ALONIA™ Violet



ALONIA™ Bicolor Violet



ALONIA™ Pink Flirt



ALONIA™ Snowball

Sub-Serien BIG mit einem größern Habitus



ALONIA™ BIG Grape



ALONIA™ BIG Cherry



ALONIA™ BIG Bicolor Pink Imp.



ALONIA™ BIG Bicolor Purple



ALONIA™ BIG Snow



ALONIA™ BIG Dark Pink



ALONIA™ BIG Indigo

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

ALONIA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com

ALONIA™

Angelonia angustifolia



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 3 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**30 - 36 cm**	**36 - 41 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Optional	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 20 ° - 21 °C		3. - 5. Woche 100 bis 150 ppm N	Breitband verwenden Woche 2

Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen
- Adjuvant-Spray am Stecktag

- Warme Temperatur muss gewährleistet werden, damit die Pflanzen sich entwickeln und blüten können.
- DaminozidßSpray 1200 bis 1500 ppm
- Stutzen in Woche 4 oder bei Topfen empfohlen

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	22 / 23 °C	100 ppm bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 20 - 21 °C abkühlen	Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		
Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2		Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

ALONIA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com

ALONIA™

Angelonia angustifolia



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Stutzen Woche 3 der Sämlinge oder bei Topfen
- Sämlinge unter frischer Erde zur Unterstützung der Pflanzen im reifen Stadium einpflanzen.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
8 bis 9 Wochen	Durchschnittszeit	Stutzen - ja Nächtliche Unterbrechung oder verlängerter Tag - optional	100 - 150 ppm N	Bei Jungpflanzen und bei Fertigstellung
12 cm Topf	18 ° - 20 °C			
8 bis 10 Wochen	18 ° - 20 °C		Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,5 bis 6,0	
15 cm				

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen
- Paclobutrazoldurchnässung 1 to 2 ppm kann falls nötig für Fertigstellung angewandt werden.
- Breitbandfungizid nach Transpantation spritzen
- Nach Blasenfüßen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		B-9 nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen		Paclobutrazol 1 bis 2 ppm Abgießung, falls nötig

ALONIA™

Angelonia angustifolia



ALONIA™ Dark Lavender- Fotos von Tests in verschiedenen Gebieten Nordamerikas 2020



Atlanta (GA)



Mast Young Plants (MI)



Raker Robertas (MI)



Colorado Sate Univ



Youngs Plant Farm (AL)

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

ALONIA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

ALONIA™

Angelonia angustifolia



ALONIA™ Big Bicolor Purple - Fotos von Tests in verschiedenen Gebieten Nordamerikas 2020



Metrolina Greenhouses (NC)



Colorado Sate Univ



Youngs Plant Farm (AL)



Mast Young Plants (MI)



Raker Robertas (MI)

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

ALONIA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

ALONIA™

Angelonia angustifolia



ALONIA™ Big Bicolor Pink - Fotos von Tests in verschiedenen Gebieten Nordamerikas 2020



Metrolina Greenhouses (NC)



Colorado Sate Univ



Youngs Plant Farm (AL)



Mast Young Plants (MI)



Raker Robertas (MI)

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

ALONIA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

LOLLIES™

Argyranthemum frutescens





LOLLIES™
Buttermint Imp.

- Frühe Blütezeit
- Gut angepasste Serien in 5 Farben
- Die reife Pflanze hat eine Höhe und Breite von 30 cm x 36 cm

Weitere Sorten der LOLLIES™-Serie:



LOLLIES™
Pink Pez



LOLLIES™
Berry Gummy



LOLLIES™
White Chocolate



LOLLIES™
Marshmallow

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

LOLLIES™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

LOLLIES™

Argyranthemum frutescens



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 2 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**30 - 36 cm**	**30 - 36 cm**

Durchschnittliche Zeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nein	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 4. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen

Belichtung bei Vermehrung kann optimales Wachstum beschleunigen und die Zeit bis zur Ernte kürzen Die Blüte von Argyranthemum wird von langen Tagen begünstigt. Daminozid 750 ppm in Woche 3

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,0	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,0	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,0	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	Düngung 100 ppm bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,8 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		

LOLLIES™

Argyranthemum frutescens



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Stutzen ist optional
- Niedrige Temperaturen zum Kulturende erzielen die beste Qualität

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
7 bis 8 Wochen	Durchschnittstag	Stutzen ist optional	100 - 150 ppm N	Bei Jungpflanzen und bei Fertigstellung
12 cm Topf	20 ° bis 22 °C			
8 bis 9 Wochen	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C	Nächtliche Unterbrechung oder verlängerter Tag - optional	Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,5 bis 6,0	
15 cm				

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- Zusätzliches Eisen (Fe) oder Mangan (Mn) könnte je nach Wasserqualität und Alkalinität notwendig sein.
- PGR - Paclobutrazoldurchnässung 750 bis 2000 ppm kann ggf. für die Fertigstellung von Jungpflanzen und die Awendung von Paclobutrazol 1 ppn für die Fertigstellung notwendig sein.
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen
- Nach Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,7 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Tagesneutral	Daminozid nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 5 bis 13	5,7 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen		Mit Paclobutrazol 1 - 2 ppm abgießen wenn Pflanzen 85 % ihrer gewünschten Größe erreichen

LOLLIES™

Argyranthemum frutescens



LOLLIES™ - Abbildungen von Versuchen in verschiedenen Gebieten Israels und Nordamerikas



Israel 2020



HeadStart 2021



Raker 2022



Raker 2022



Israel 2020



Israel 2020

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

LOLLIES™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

TIMELESS™ COLLECTION

Bidens ferulifolia





Blazing Flames™

- • Minimum bis kein PGR nötig
- Das neue Blazing Star™ hat ein deutlich einprägsames Farbmuster
- Gut geeignet für Produktion in kleinen (12 cm) Behältern

KOMPAKT UND IN DIE HÖHE STREBEND



Blazing Embers™



Yellow Crown™

AUFGETÜRMT /HALBHÄNGEND



Yellow Splash Imp. ™



Blazing Glory™



Yellow Charm™

IN DIE HÖHE STREBEND



Golden Empire™



White Delight ™ Imp.

AUFGETÜRMT



Blazing Fire™



Blazing Ring of Fire™



Pretty In Pink™ Imp.



Sunshine Double™



Blazing Star™



Blazing Volcano™



Mega Charm™



Yellow Sunshine™

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

VANESSA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

TIMELESS™ COLLECTION

Bidens ferulifolia



Bewurzelungstips

- Steckpriorität 4 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**20 - 36 cm**	**15 - 36 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nein	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen

Breitbandfungizid am Stecktag anwenden um Blätterkrankheiten zu vermeiden. Betreffend mehr robust wachsende Sorten, Daminozid-Spray 1500 ppm in Woche 3 anwenden

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	Düngung 100 ppm bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

VANESSA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

TIMELESS™ COLLECTION

Bidens ferulifolia



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Stutzen ist optional
- Niedrige Temperaturen zum Kulturende erzielen die beste Qualität.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
6 bis 8 Wochen	Durchschnittstag	Stutzen wird nicht empfohlen	100 - 200 ppm N	DaminozidßSpray 1500 bis 2500 ppm
12 cm Topf	18 ° - 20 °C			
7 bis 9 Wochen	1 ppm	Nicht notwendig - Tagesneutral	Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,8 bis 6,2	
15 cm				
7 bis 9 Wochen	3 ppm			
20 cm				

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB
	Rhizoctonia	QUINTOZENE, TOLCLOFOS METHYL

- PGR - Daminozid-Spray 1500 bis 2500 ppm kann ggf. für die Fertigstellung von Jungpflanzen und die Awendung von Paclobutrazoldurchnässung 1 ppm für die Fertigstellung der lebhafteren Sorten notwendig sein.
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen Nach Topfen und dann wieder während der Fertigstellung zum Schutz gegen Rhizoctonia durchtränken.
- Nach Blasenfüßen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid 1500 ppm bis 2500 nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 6 bis 12	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 200 ppm	Nicht notwendig	Mit 1 ppm Paclobutrazol abgießen		Mit Paclobutrazol 1 ppm abgießen wenn Pflanzen 85 % ihrer gewünschten Größe erreichen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

BIDENS™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

TIMELESS™ KOLLEKTION

BIDENS™

Bidens ferulifolia



Israel 2022



Konklin, 2022







Israel 2022



Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

BIDENS™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

EYECONIC™

Calibrachoa hybrida





EYECONIC™ Orange

- Gewählt nach dem Farbmuster des Auges der großen Blüten
- Bildet ein prächtiges Bouquet un lässt sich gut kombinieren
- Blüht 10 Stunden am Tag
- **Getestet für pH-Sensitivität**
- Die fertige Pflanze hat eine Höhe und Breite von
  30 cm x 36 cm

Weitere Variationen der EYECONIC™-Serie:



EYECONIC™ Cherry Blossom Imp.



EYECONIC™ Pink



EYECONIC™ Strawberry



EYECONIC™ Apricot



EYECONIC™ Peach



EYECONIC™ Compact Sunset



EYECONIC™ Purple

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

EYECONIC™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com

EYECONIC™

Calibrachoa hybrida



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 3 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**30 - 36 cm**	**30 - 36 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Optional	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 150 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen

Das Verwenden von K-IBA kann die Bewurzelung beschleunigen. Beleuchtung bei Vermehrung für ein optimales Wachstum und um die Ernte zu beschleunigen. Daminozid 1200 bis 1500 ppm am Stecktag Daminozid und Uniconazol-P Tank mix Woche 3 um gegebenenfalls die Streckung zu kontrollieren.

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,2 / 5,8	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Stecktag	
Woche 2	5,2 bis 5,8	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	5,2 bis 5,8	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	Düngung 100 ppm bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,2 bis 5,8	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 ppm bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		
Woche 5	5,2 bis 5,8	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 ppm bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		

EYECONIC™

Calibrachoa hybrida



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Stutzen ist optional
- Niedrige Temperaturen bei Fertigstellung erzielen die beste Qualität

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
7 bis 8 Wochen	Durchschnittszeit	Kein Stutzen notwendig	100 - 150 ppm N	Bei Jungpflanzen und bei Fertigstellung
12 cm Topf	18 ° - 20 °C			
8 bis 9 Wochen	18 ° - 20 °C	Keine Belichtung notwendig	Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,5 bis 6,0	
15 cm				
8 bis 9 Wochen				
20 cm	3 Pflanzen pro Topf			
8 bis 9 Wochen				
25 cm	3 Pflanzen pro Topf			

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- Zusätzliches Eisen (Fe) oder Mangan (Mn) könnte je nach Wasserqualität und Alkalinität notwendig sein.
- Nach Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 6	5,6 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Tagesneutral	Daminozid nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 6 bis 12	5,6 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen		Mit Paclobutrazol 1 - 2 ppm abgießen wenn Pflanzen 85 % ihrer gewünschten Größe erreichen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

EYECONIC™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com

EYECONIC™

Calibrachoa hybrida



Konklin, 2022



Sawaya Waterford, 2022





Konklin, 2022



MYP, 2022



Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

EYECONIC™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com

GOLF™

Craspedia sp.





GOLF™
GOLF™ Beauty Improved

- Erhöhte Vitalität und verbesserte Bewurzelung macht diese Pflanze zu einem geeigneten Kandidaten für Produktion in allen Märkten.
- Die einzigartigen hellgelben Blüten ziehen die Aufmerksamkeit der Endkunden an
- Bewährt sich gut als ein höhenspendes Element in Kombinationen
- Die fertige Pflanze hat eine Höhe und Breite von
  41 cm x 25 cm

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

GOLF™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

GOLF™

Craspedia sp.



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 1 von 4
- Nicht für Aufbewahrung geeignet (Risse und Pfropfen in kalten Lagerhäusen)

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**25 - 30 cm**	**36 - 36 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 / 6 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Empfohlen	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5./6. Woche 19 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 150 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid in Woche 2 sprühen

Irrigationshinweis - möglichst frühzeitig (Tag 2 oder 3) vom Sprühnebel entfernen.

Vor der Implantation die Enden der Stecklinge in ein Wurzelungshormon eintauchen oder mit K-IBA-Spray besprühen, was eine uniforme Bewurzelung ermöglicht.
Daminozid 1200 bis 1500 ppm am Stecktag Pflanzen knoten wenn sie sich zu strecken beginnen um die Entwicklung von Zweigen an der Basis der Pflanze zu fördern.

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,4	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Optional		Stecktag	Zusätzliche Belichtung kann Blüte beschleunigen
Woche 2	5,8 bis 6,4	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Optional		Zweite Fungizidanwendung	Fungizidanwendung zur Kontrolle Von Botrytis!
Woche 3	5,8 bis 6,4	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	100 ppm bis 150 ppm	Optional	Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,8 bis 6,4	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 ppm bis 150 ppm	Optional	Daminozid nach Bedarf		
Woche 5	5,8 bis 6,4	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 ppm bis 150 ppm	Optional	Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:
GOLF™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER
www.danzigeronline.com

GOLF™

Craspedia sp.



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Stutzen Woche 3 der Sämlinge oder bei Topfen
- Sämlinge unter frischer Erde einpflanzen, um Pflanzen im reifen Stadium zu unterstützen.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
8 bis 9 Wochen	Durchschnittszeit	Stutzen - ja Zusätzliche Belichtung ist nicht notwendig	100 - 150 ppm N	Bei Jungpflanzen und bei Fertigstellung
12 cm Topf	20 ° bis 22 °C			
8 bis 10 Wochen	18 ° - 20 °C		Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,8 bis 6,4	
15 cm				

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Daminozid-Spray 2000 bis 2500 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen
- Paclobutrazol-Durchnässung 1 bis 2 ppm kann falls nötig für Fertigstellung eingesetzt werden.
- Durchnässung mit einem Breitband-Fungizid nach dem Topfen
- Nach Blattläusen muss regelmäßig untersucht werden


Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		B-9 nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 6 bis 14	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen		Paclobutrazol 1 bis 2 ppm Abgießung, falls nötig


GOLF™

Craspedia sp.



Craspedia GOLF™ - Aufnahmen von kommerziellen Produktionsstätten in Europa, 2022





Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

GOLF™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER


www.danzigeronline.com

GOLF™

Craspedia sp.



Craspedia GOLF™ - Aufnahmen von kommerziellen Produktionsstätten in Europa, 2022



CRASPEDIA POT

- Golf Beauty

Nota: Cosechar de la base de la planta.

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

GOLF™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL SEEKER™

Helianthus hybrid





SOL SEEKER™
Bronze Burst

- Frühe Blüte, üppiger Habitus
- Verminderte PGR-Anwendung notwendig
- Höhe und Breite der reifen Pflanze
- Sol Seeker Bee Yellow – 91 cm x 91 cm
- Sol Seeker Golden Nectar – 91 cm x 102 cm
- Sol Seeker Honey – 102 cm x 76 cm
- Sol Seeker Bronze Burst – 110 cm x 91 cm

Weitere Auswahl in der SOL SEEKER™-Serie:



SOL SEEKER™
Bee Yellow



SOL SEEKER™
Golden Nectar



SOL SEEKER™
Honey

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

SOL SEEKER™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL SEEKER™

Helianthus hybrid



Neu 2025

BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 3 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	76 - 102 cm	91 - 110 cm

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Optional	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 20 ° - 21 °C		3. - 5. Woche 100 bis 150 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungshinweis - Nebel am Abendeinbruch reduzieren, um die Bedingungen der Krankheitsdrucks zu mindern
Breitband-Fungizid am Tag nach dem Stecktag und in Woche 3 sprühen (für Mehltauvermeidung einschließen)

Das Verwenden von K-IBA kann die Bewurzelung beschleunigen. Daminozid 1200 ppm in Woche 4 oder knapp vor Transplantation

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Tagesverlängerung		Stecktag	bis 12 - 14 Stunden
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Tagesverlängerung			
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	Düngung 100 bis 150 ppm	Tagesverlängerung		Zweite Fungizidanwendung	
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Tagesverlängerung	Daminozid nach Bedarf		Nach Transpantation kneifen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

SOL SEEKER™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL SEEKER™

Helianthus hybrid



Neu 2025

HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Nach Transpantation bzw. eine Woche danach kneifen
- Nächtliche Temperatur über 18 °C halten. Niedrigere Temperatren werden das Pflanzenwachstum stoppen, aber die Blüte wird sich weiter entwickeln.
- Längere Tage und warme Temperaturen beschleunigen das Wachstum.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
6 bis 8 Wochen	Durchschnittstag	Verlängerte Tagesbeleuchtung auf 12 bis 14 Stunden falls Tageslänge unter 12 St. liegt	150 - 200 ppm N	Daminozid 2,000 bis 2,500 ppm als Spray anwenden
12 cm Topf	18 °C			
8 bis 9 Wochen	18 °C 1 Pflanze pro Behälter		Substrat EC 1,0 - 1,5 pH 5,7 bis 6,3	
15 cm				
8 bis 9 Wochen				
20 cm	3 Pflanzen pro Topf			

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- Spray gegen Mehltau
- Temperatur ist für das regelrechte Wachstum maßgebend. Nächtliche Temperatur über 18 °C halten.
- Tageslichtverlängerung bis 12 - 14 Stunden bei herschenden Kurztagbedingungen
- Nach Blasenfüßen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden
- Paclobutrazoldurchnässung 1 to 2 ppm kann falls nötig für Fertigstellung angewandt werden.

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 6	5,7 bis 6,3	1,0 bis 1,2		Düngung 100 bis 150 ppm	S. oben	Daminozid nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 6 bis 13	5,7 bis 6,3	1,0 bis 1,5		Düngung 150 bis 200 ppm		Mit 1 ppm Paclobutrazol abgießen		Mit Paclobutrazol 1 ppm abgießen wenn Pflanzen 85 % ihrer gewünschten Größe erreichen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

SOL SEEKER™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL LUNA PRIME™

New Guinea Impatiens





SOL LUNA PRIME™ Peach

- Begnüt sich sowohl mit Sonne als auch mit Schatten
- Der Endkunde kann es überall pflanzen und eine üppige Kugel mit leuchtenden Farben genießen
- Eine kompakte gut abgestimmte Serie, die leicht zu kultivieren und bei der Produktion verlässlich ist
- Perfekt als ein Premium Paket und für Produktion in kleinen Blumentöpchen geeignet,
  passt wunderbar in ein 15 cm Behältnis
- Die reife Pflanze hat eine Höhe und Breite von 30 cm x 46 cm

Weitere Sorten der RA™SOL LUNA PRIME™-Serie:



SOL LUNA PRIME™ Pearl



SOL LUNA PRIME™ Orchid



SOL LUNA PRIME™ Light Salmon



SOL LUNA PRIME™ Red



SOL LUNA PRIME™ White

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

SOL LUNA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

SOL LUNA PRIME™

New Guinea Impatiens



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 2 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**30 - 36 cm**	**30 - 46 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Optional	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 80 ppm N	Breitband verwenden Woche 2

Adjuvant-Spray am Stecktag

- Mit Ethephon 300 ppm am folgenden Tag nach der Stecktag besprühen. Dadurch wird die Blüte verstärkt. Es genügt eine Stunde Ethephon auf die Blätter nach Entfernung des Nebels.
- Warme Temperatur muss gewährleistet werden, damit die Pflanzen sich entwickeln und blüten können.
- Mittlere Tagestemperatur 21 °C

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	6,0 / 6,5	0,50	22 / 23 °C		Nicht notwendig		Stecktag	
Woche 2	6,0 / 6,5	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	6,0 / 6,5	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	80 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig			
Woche 4	6,0 / 6,5	0,80 bis 0,90	21 - 22 °C	80 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig			
Woche 5	6,0 / 6,5	0,80 bis 0,90	21 - 22 °C	80 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig			Stutzen wird nicht empfohlen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

SOL LUNA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL LUNA PRIME™

New Guinea Impatiens



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Für richtiges Wachstum und Größe der Pflanze muss die EC niedrig gehalten werden.
- Topfen der Sämlinge wenn die Pflanzen eingewurzelt sind und aktives Wachstum zeigen

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
7 bis 8 Wochen	Durchschnittszeit	Stutzen - nein Tageslänge - neutral	100 - 125 ppm N	Falls notwendig, 5 bis 7 ppm Uniconazol-Spray in früher Ernteperiode anwenden Paclobutrazol 0,5 ppm Abgießung binnen 3 Wochen vor Fertigstellung
12 cm Topf	20 ° - 21 °C			
8 bis 9 Wochen	20 ° - 21 °C		Substrat EC 0,8 - 1,0 pH 6,0 bis 6,5	
15 cm				

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Uniconazol-Spray 5 bis 7 ppm frühzeitig bei Ernte anwenden
  Paclobutrazol-Durchnässung 0,5 ppm für Fertigstellung
- Spray: Breitbandfungizid nach Transplantation
- Nach Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		Uniconazol-Spray	Abgießung mit Fungizid bei Topfen	
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		Mit 0,5 ppm Paclobutrazol abgießen		PGR nur nach Erreichen von 85 % der gewünschten Größe

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:
SOL LUNA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER
www.danzigeronline.com

MENOR™

Petunia hybrida





MENOR™
Dual Magenta

- Frühe Blüte mit schwerer Blumanbedeckung
- Erhöhte Hitzewiderstandsfähigkeit verglichen mit anderen Nemesia-Sorten am Markt
- Die reife Pflanze hat eine Höhe und Breite von 20 cm x 25 cm

Weitere Sorten der MENOR™-Serie:



MENOR™ Dual Bordeaux



MENOR™ Dual Purple



MENOR™ Dual Violet

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

MENOR™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

MENOR™

Petunia hybrida



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 3 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**25 - 30 cm**	**25 - 36 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nein	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 4. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen

Breitbandfungizid am Stecktag anwenden um Blätterkrankheiten zu vermeiden. Betreffend mehr robust wachsende Sorten, Daminozid-Spray 2000 ppm in Woche 3 anwenden

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,6 / 6,0	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel		Daminozid nach Bedarf	Stecktag	
Woche 2	5,6 bis 6,0	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	5,6 bis 6,0	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	Düngung 100 ppm bis 150 ppm				
Woche 4	5,6 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

MENOR™ **HIER KLICKEN**

MENOR™

Petunia hybrida



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Substrat muss gleichmäßig feucht bleiben und nicht zu nass während der kühleren Wachstumsperioden sein. Das Wurzelsystem und Laub kann unter andauernder Nässe des Substrats Probleme entwickeln.
- Niedrige Temperaturen zum Kulturende erzielen die beste Qualität.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
6 bis 7 Wochen	Durchschnittszeit	Stutzen wird nicht empfohlen	100 - 200 ppm N	Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm
12 cm Topf	18 ° - 20 °C			
8 bis 9 Wochen	1 ppm	Nicht notwendig - Tagesneutral	Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,6 bis 6,0	
15 cm				
8 bis 9 Wochen				
20 cm	3 ppm			Mit 2 ppm Paclobutrazol abgießen

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Die Menor-Serie ist non Natur aus kompakt, daher ist die PGR-Anwendung optional. Falls notwendig, kann Daminozid bis 2500 ppm für nach Fertigstellung der Jungpflanzen erwogen werden.
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen
- Nach Blattläusen, Miniermotten, Milben und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,6 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 150 bis 200 ppm	Nicht notwendig	Daminozid 2500 ppm nach Bedarf	Abgießung mit Fungizid bei Topfen	
Woche 6 bis 12	5,6 bis 6,0	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 150 bis 200 ppm	Nicht notwendig	Mit 2 ppm Paclobutrazol abgießen		Mit Paclobutrazol 2 ppm abgießen wenn Pflanzen 85 % ihrer gewünschten Größe erreichen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

MENOR™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

PAZZAZ NANO™

Portulaca oleracea







PAZZAZ NANO™
Mango

- Natürlich kompakter, hängender Habitus, der sich gut in kleinen und mittelgroßen Behältern präsentiert.
- Perfekt für hitze-und durchzugbeständige Bedingungen.
- In einer breiten Palette lebhafter Farben erhältlich
- Die reife Pflanze hat eine Höhe und Breite von 20 cm x 30 cm

Weitere Sorten der PAZZAZ™ NANO Serie:



PAZZAZ™ NANO Deep Orange



PAZZAZ™ NANO Orange Twist



PAZZAZ™ NANO Yellow Twist



PAZZAZ™ NANO Gold



PAZZAZ™ NANO Tropical Punch



PAZZAZ™ NANO Fuchsia Imp.



PAZZAZ™ NANO Candy Pink



PAZZAZ™ NANO Purple



PAZZAZ™ NANO Yellow



PAZZAZ™ NANO Hot Pink



PAZZAZ™ NANO Orange

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

PAZZAZ NANO™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

PAZZAZ NANO™

Portulaca oleracea





BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 1 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**25 - 30 cm**	**20 - 25 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nein	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 4. Woche 20 ° - 21 °C		3. - 4. Woche 100 bis 150 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungshinweis - möglichst frühzeitig Sprühnebel reduzieren /übermäßiges Besprühen verursacht ungleichmäßige und verspätete Wurzelung.

Diese Art hat Höchstpriorität für Steckung. Nach Erhalt sind die Pflanzen aus dem Karton zu entnehmen, um Luftbewegung rund um die Säckchen zu ermöglichen. Daminozid 1500 ppm am Tag nach dem Stecktag.
Je nach Wachsrum, in Woche 3 oder beim Topfen stutzen, um die Entwicklung von Zweigen zu begünstigen.

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Zusätzliche Belichtung ist nicht notwendig	Daminozid am Tag nach demr Stecktag	Stecktag	Düngung über Sprühnebel
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	100 ppm bis 150 ppm				
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

PAZZAZ NANO™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com

PAZZAZ NANO™

Portulaca oleracea





HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Zwischen den Begießungen Pflanzen ganz trocken lassen
- Warme Temperatur muss gewährleistet werden, damit die Pflanzen sich entwickeln können.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
5 bis 6 Wochen	Durchschnittszeit	Kneifen Zusätzliche Belichtung kann die Blüte an kurzen Tagen beschleunigen	150 - 200 ppm N	Daminozid 2500 ppm für Fertigstellung falls nötig
12 cm Topf	20 ° bis 22 °C			
6 bis 7 Wochen			Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,8 bis 6,2	
15 cm				
7 bis 9 Wochen				
20 cm	3 Pflanzen pro Topf			

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Daminozid-Spray für Höhenkontrolle
- Nach Blattläusen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf	Abgießung mit Fungizid bei Topfen	
Woche 5 bis 12	5,8 bis 6,2	1,2 bis 1,5	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid 2500 ppm für Fertigstellung		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

PAZZAZ NANO™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

TOUCH™

Scaevola aemula





TOUCH™
Indigo

- Die White Touch™-Sorte bleibtrein weiß auch bei niedrigen Temperaturen
- White Touch ™ und Blue Touch ™ eignen sich hervorragend für Körbchen und Kombinationen
- Die Höhe und Breite der reifen Pflanze beträgt
  30 cm x 20 cm

Weitere Sorten in der TOUCH™-Kollektion:



TOUCH™
Blue



TOUCH™
White



TOUCH™
Baby Pink

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

TOUCH™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

TOUCH™

Scaevola aemula



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 4 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**25 - 41 cm**	**20 - 25 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Empfohlen	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 20 ° - 21 °C		3. - 5. Woche 100 bis 150 ppm N	Breitband verwenden Woche 2

Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen
Erde soll nicht 0bermäßig mit Sprühnebel gespritzt oder gesättigt werden - Adjuvant-Spray am Stecktag

- Warme Temperatur muss gewährleistet werden, damit die Pflanzen sich entwickeln und blüten können.
- Daminozid-Spray 2000 bis 2500 ppm nach Bedarf
- Stutzen in Woche 4 oder bei Topfen empfohlen

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	22 / 23 °C	Düngung 100 ppm bis 150 ppm	Nicht notwendig			
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2		Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig			
Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2		Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		Daminozid 2000 bis 2500 ppm

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

TOUCH™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

TOUCH™

Scaevola aemula



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Temperaturen mäßig warm halten, um den Pflanzen die weitee Entwicklung zu ermöglichen (mittlere Tagestemperatur 20 bis 21 °C)

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
6 bis 7 Wochen	Durchschnittszeit	Stutzen - ja Nächtliche Unterbrechung oder verlängerter Tag - optional	150 - 200 ppm N	Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen
12 cm Topf	20 ° - 21 °C			
8 bis 9 Wochen			Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,8 bis 6,2	
15 cm				
8 bis 9 Wochen				
20 cm	3 Pflanzen pro Topf			

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen
- Paclobutrazoldurchnässung 1 to 2 ppm kann falls nötig für Fertigstellung angewandt werden.
- Spray: Breitbandfungizid nach Transplantation
- Nach Blattläusen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		B-9 nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Mit Paclobutrazol nach Bedarf durchtränken		Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen

VANESSA™ COMPACT

Verbena x hortensis





VANESSA™ COMPACT
Bordeaux

- Getested für Mehltau-Widerstandsfähigkeit und Farbzyklus
- Diese Subserie der Hochleistungs-Vanessa hat einen natürlich kontrollierten Habitus.
- Wenig bis kein PGR ist notwendig
- Die fertige Pflanze hat, respektive, eine Höhe und Breite von (25cm X 30cm)

Weitere Sorten in der V ANESSA™ COMPACT-Serie:



VANESSA™ COMPACT
Violet



VANESSA™ COMPACT
White



VANESSA™ COMPACT
Rosa



VANESSA™ COMPACT
Bicolor Purple



VANESSA™ COMPACT
Bicolor Rose



VANESSA™ COMPACT
Deep Pink



VANESSA™ COMPACT
Lavender



VANESSA™ COMPACT
Lime



VANESSA™ COMPACT
Neon Pink



VANESSA™ COMPACT
Optik Lavender



VANESSA™ COMPACT
Pink



VANESSA™ COMPACT
Red

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

VANESSA™ COMPACT **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

VANESSA™ COMPACT

Verbena x hortensis



Bewurzelungstips

- Steckpriorität 3 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**25 - 36 cm**	**15- 20 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nicht notwendig	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 4. Woche 18 ° - 21 °C		3. - 4. Woche 100 bis 150 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungshinweis - möglichst frühzeitig Sprühnebel reduzieren

Adjuvant-Spray am Stecktag. Daminozid 2000 ppm am Tag nach dem Stecktag
Kein Stutzen ist nonwendig um einen ausgezeichneten Keimling zu erzeugen

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Neutral	Daminozid am Tag nach dem Stecktag	Stecktag	Düngung über Sprühnebel
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	100 ppm bis 150 ppm				
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

VANESSA™ COMPACT **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

VANESSA™ COMPACT

Verbena x hortensis



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Verbena reagiert gut auf negative DIF hinsichtlich Höhenkontrolle der Pflanze
- Verbena Vanessa™ blütet rasch und problemlos um den Bedürfnissen der Frühsaison zu genügen

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
5 bis 6 Wochen	Durchschnittstag	Kein Stutzen nötig Tagesneutral	150 - 200 ppm N	Daminozid 2500 ppm für Fertigstellung Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol für Veredelung abgießen
12 cm Topf	16 ° bis 20 °C			
6 bis 7 Wochen			Substrat EC 1,0 - 1,5 pH 5,8 bis 6,2	
15 cm				
7 bis 8 Wochen				
20 cm	3 Pflanzen pro Topf			
7 bis 8 Wochen				
25 cm	3 Pflanzen pro Topf			

Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Daminozidspray für Höhenkontrolle / Paclobutrazol-Abgießung für Fertigstellung
- Nach Blattläusen, Miniermotten, Thrips und Mottenschildläusen muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid 2500 ppm nach Bedarf	Abgießung mit Fungizid bei Topfen	
Woche 5 bis 12	5,8 bis 6,2	1,2 bis 1,5	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Paclobutrazol 1 bis 2 ppm Abgießung		Paclobutrazol Abgießung wenn Pflanzen 85 % ihrer gewünschten Größe erreichen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

VANESSA™ COMPACT **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

PANAMA™

Echinacea hybrid





PANAMA™ Rose



PANAMA™ Red

- Kältewiderstandsfähigkeit 5 - 9
- Keine Vernalisation oder Kühlung notwendig
- Blüte bereits im frühen Frühling
- Die erste von URC erhältliche vegetative Echinacea
- Die Höhe und Breite der reifen Pflanze beträgt
  14 cm x 16 cm

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

PANAMA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

PANAMA™

Echinacea hybrid



Bewurzelungstips

- Steckpriorität – 2 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**36 - 41 cm**	**30 - 36 cm**

Durchschnittliche Zeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nein	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Am Stecktag mit Adjuvant besprühen /Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen.

Der Einsatz von K-IBA-Spray kann die Wurzelungsreaktion beschleungen und ebnen.
Echinacea Panama™ ist ein Langtagblüter und die natürliche Blütezeit ist im Juni (fakultltative Langtagpflanze)
Adäquates Substrat für Jungpflanzen mit pH von 5,8 bis 6,5 und EC von 0,8 mS.

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,6 / 6,0	0,80	21 / 22 C	50 ppm N im Sprühnebel	Benötigte Tagesbelichtung von 12 h		Stecktag	
Woche 2	5,6 bis 6,0	0,80 bis 0,90	21 / 22 C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	100 ppm bis 150 ppm				
Woche 4	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	20 bis 21 °C	Düngung 100 bis 150 ppm				
Woche 5	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	20 bis 21 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		1500 bis 2000 ppm Daminozid

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

PANAMA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

PANAMA™

Echinacea hybrid



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Kneifen scheint nicht notwendig zu sein
- Natürlich kompakterr Habitus der Pflanze
- Gegen bakterielle Blattfäule besprühen

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
8 bis 10 Wochen	Durchschnittstag	Stutzen ist nicht notwendig /Tageslicht bis 12 Stunden verlängern um Blüte zu beschleunigen	100 - 150 ppm N	Daminozid-Spray Anwendung 2000 – 2500 ppm
15 cm (1 Gallon)	20 ° bis 21 °C			
8 bis 10 Wochen	3 Pflanzen pro Topf		Substrat EC 0,8 - 1,2 pH 5,8 bis 6,2	
20 cm (2 Gallons)				

		Empfohlene Chemikalien
Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- Langtag-Blütereaktion Natürliche BlüteperiodeÖ Woche 24 - 27
- PGR - Daminozid-Spray 2000 bis 2500 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen frühzeitig bei Ernte anwenden
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen /gegen bacterielles Blattfäulnis besprühen
- Nach Transplantation wegen Botrytis und Pythium / Phytophthoradurchtränken.

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 6	5,8 bis 6,2	0,8 bis 1,0	20 ° bis 21 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf	Abgießung mit Fungizid bei Topfen	Pythium & Phytophthora Kontrolle
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,2	0,8 bis 1,2	20 ° bis 21 °C	Düngung 150 bis 200 ppm			Fungizid sprühen für Abschirmung vor	Gegen bakterielle Blattfäulnis besprühen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

PANAMA™ HIER KLICKEN

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

GUATEMALA™

Echinacea hybrid





Guatemala™ Papaya



Guatemala™ Gold

- Kältewiderstandsfähigkeit 5 - 9
- Keine Vernalisation oder Kühlung notwendig
- Natürliche Blütezeit im Juni
- Die zweite von URC erhältliche vegetative Echinacea
- Die Höhe und Breite der reifen Pflanze beträgt
  20 cm x 36 cm

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

GUATEMALA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

GUATEMALA™

Echinacea hybrid



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 2 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	18 - 26 cm	30 - 38 cm

Durchschnittliche Zeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nein	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag sprühen
	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Am Stecktag mit Adjuvant besprühen /Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen.

Der Einsatz von K-IBA-Spray kann die Wurzelungsreaktion beschleunigen und ebnen.
Echinacea Panama™ ist ein Langtagblüter und die natürliche Blütezeit ist im Juni (fakultltative Langtagpflanze)
Adäquates Substrat für Jungpflanzen mit pH von 5,8 bis 6,5 und EC von 0,8 mS.

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,6 / 6,0	0,80	21 / 22 C	50 ppm N im Sprühnebel	Benötigte Tagesbelichtung von 12 h		Stecktag	
Woche 2	5,6 bis 6,0	0,80 bis 0,90	21 / 22 C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	100 ppm bis 150 ppm				
Woche 4	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	20 bis 21 °C	Düngung 100 bis 150 ppm				
Woche 5	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	20 bis 21 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		1500 bis 2000 ppm Daminozid

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

GUATEMALA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

GUATEMALA™

Echinacea hybrid



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Kneifen scheint nicht notwendig zu sein
- Natürlich kompakter Habitus der Pflanze
- Gegen bakterielle Blattfäulnis besprühen

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
8 bis 10 Wochen	Durchschnittstag	Stutzen ist nicht notwendig /Tageslicht bis 12 Stunden verlängern um Blüte zu beschleunigen	100 - 150 ppm N	Daminozid-Spray Anwendung 2000 – 2500 ppm
15 cm (1 Gallon)	20 ° bis 21 °C			
8 bis 10 Wochen	3 Pflanzen pro Topf		Substrat EC 0,8 - 1,2 pH 5,8 bis 6,2	
20 cm (2 Gallons)				

		Empfohlene Chemikalien
Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- Langtag-Blütereaktion Natürliche Blüteperiode: Woche 24 - 27
- PGR - Daminozid-Spray 2000 bis 2500 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen frühzeitig bei Ernte anwenden
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen /gegen bakterielle Blattfäulnis besprühen
- Nach Transplantation wegen Botrytis und Pythium / Phytophthora durchtränken.

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 6	5,8 bis 6,2	0,8 bis 1,0	20 ° bis 21 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf	Abgießung mit Fungizid bei Topfen	Pythium- und Phytophthora-Kontrolle
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,2	0,8 bis 1,2	20 ° bis 21 °C	Düngung 150 bis 200 ppm			Bei Fertigstellung Fungizid	gegen bakterielle Blattfäulnis besprühen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

GUATEMALA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

GUATEMALA™

Echinacea hybrid



Israel 2022



Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

GUATEMALA™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |


STEFFI™

Gaura lindheimeri





STEFFI™
Dark Rose Imp.



- Kältewiderstandsfähigkeit 5 - 9
- Keine Vernalisation oder Kühlung notwendig
- Blüte bereits im frühen Frühling
- Leicht zu wurzeln
- STEFFI White besitzt ein beständiges, prächtiges, aufrechtsstehendes dunkelgrünes Laub ohne die üblichene roten Flecke der früheren genetischen Sorten
- Die Höhe und Breite der reifen Pflanze beträgt
  18 cm x 20 cm

Weitere Sorten der STEFFI™-Serie:



STEFFI™
Blush Pink Imp.



STEFFI™
White

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

STEFFI™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

STEFFI™

Gaura lindheimeri



Bewurzelungstips

- Steckpriorität – 3 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**46 - 51 cm**	**41 - 46 cm**

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Empfohlen	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen. Wurzelung am besten bei hoher Feuchtigkeit und vermindertem Nebel

Gaura sind fakultative Langtagpflanzen/Blüte wird bei länger dauernden Tagen beschleunigt Daminozid 1500 bis 2500 ppm in Woche 4 Nach Transpantation kneifen

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,6 / 6,0	0,80	21 / 22 C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Stecktag	
Woche 2	5,6 bis 6,0	0,80 bis 0,90	21 / 22 C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	Auf 21 - 20 °C abkühlen	100 ppm bis 150 ppm				
Woche 4	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	20 bis 21 °C	100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		
Woche 5	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		Stutzen wird nicht empfohlen

STEFFI™

Gaura lindheimeri



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Erde gleichmäßig feucht halten
- Fertigstellung am besten bei hoher Belichtung

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
9 bis 10 Wochen	Durchschnittstag	Kneifen - empfohlener Transplantationstag	100 - 150 ppm N	Daminozid-Spray Anwendung @ 2000 – 3750 ppm
15 cm (1 Gallon)	(18 °C)			
9 bis 11 Wochen			Substrat EC 0,8 - 1,0 pH 5,8 bis 6,2	
20 cm (2 Gallons)				

		Empfohlene Chemikalien
Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- PGR - Daminozid-Spray 2000 bis 3750 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen frühzeitig bei Ernte anwenden
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen
- Nach Blattläusen, Miniermotten, Milben und Thrips muss regelmäßig untersucht werden
- Nach Transplantation wegen Botrytis und Pythium / Phytophthora durchtränken.

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 6	5,8 bis 6,2	0,08 bis 1,0	18 ° bis 20 °C	100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf	Abgießung mit Fungizid bei Topfen	Pythium & Phytophthora Kontrolle
Woche 6 bis 14	5,8 bis 6,2	0,8 bis 1,0	16 ° bis 18 °C	100 bis 150 ppm				

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

STEFFI™ **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SALVIA KOLLEKTION

Salvia nemorosa





PINK NEBULA™



DARK MATTER™

- Kältewiderstandsfähigkeit 4 - 9
- Keine Vernalisation oder Kühlung notwendig
- Dark Matter ist eine einzigartige Sorte ihrer Art mit großen tiefblauen Blüten
- Starke radiale Zweigbildung
- Die Höhe und Breite der reifen Pflanze beträgt 41 cm x 41 cm

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

SALVIA KOLLEKTION **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

SALVIA KOLLEKTION

Salvia nemorosa



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität 3 von 4

Blütezeit	Breite	Höhe
Frühjahr / Sommer Blüte	**36 - 51 cm**	**36 - 46 cm**

Durchschnittliche Zeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Optional	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag sprühen
	3. - 4. Woche 20 ° - 21 °C		3. - 4. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche

Bewässerungseinleitung - Am Stecktag mit Adjuvant besprühen /Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen.

Salvia nemorosa Dark Matter™ und Sallyrosa™ sind tagesneutral. Der Einsatz von K-IBA-Spray kann die Wurzelungsreaktion beschleunigen und ebnen. Im Jungpflanzenstadium oder bei Topfen kneifen um Zweigbildung zu fördern.

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidan wendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 20 bis 21 °C kühlen	100 ppm bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	20 bis 21 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		Stutzen wird empfohlen

SALVIA KOLLEKTION

Salvia nemorosa



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Fertigstellung bei niedrigen Temperaturen verbessert die Qualität und die Langlebigkeit der Blumen
- Dark Matter™ kann zusätzliche PGR-Anwendungen bei Qualitätsfertigstellung verlangen /das ist eine Sorte mit vermehrtem Wachstum.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
8 bis 9 Wochen	Durchschnittstag	Stutzen ist optional	150 - 200 ppm N	Daminozid-Spray Anwendung 2000 – 3750 ppm Paclobutrazol 1 bis 2 ppm Durchtränkung
10 cm (kleine Behälter)	16 ° bis 18 °C			
9 bis 11			Substrat EC 1,2 - 1,5 pH 5,8 bis 6,3	
15 cm (1 Gallon)				

		Empfohlene Chemikalien
Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB

- Kühle Temperaturen bei Fertigstellung sorgen für Pflanzen hoher Qualität
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen
- Nach Blattläusen, Miniermotten und Mottenschildläusen muss regelmäßig untersucht werden
- Nach Transplantation wegen Botrytis und Pythium /Phytophthora durchtränken.

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,3	1,0 bis 1,2	16 ° bis 18 °C	Düngung 100 bis 150 ppm			Abgießung mit Fungizid bei Topfen	Pythium- und Botrytis-Kontrolle
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,3	1,2 bis 1,5	16 ° bis 18 °C	Düngung 150 bis 200 ppm		Dark Matter kann zusätzliche Anwendungen verlangen		Daminozid-Spray Anwendung 2000 – 3750 ppm Paclobutrazol 1 bis 2 ppm Durchtränkung

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

SALVIA KOLLEKTION **HIER KLICKEN**

DANZIGER

www.danzigeronline.com