DANZIGER
ANNUALS
Technical Product Pages

2024-2025



Русский

DANZIGER

ALONIA™

Ангелония узколистная





ALONIA™ Purple

- Раннее цветение
- Высокая жароустойчивость
- Можно выращивать в небольших горшках, но при посадке в сад цветок разрастается
- Высота и ширина в зрелом возрасте:
  36 см x 30 см для Алонии и
  41 см x 36 см для Алонии Большой

Другие сорта серии ALONIA™:



ALONIA™ Dark Lavender



ALONIA™ Violet



ALONIA™ Bicolor Violet



ALONIA™ Pink Flirt



ALONIA™ Snowball

Разновидности сорта BIG с более крупной формой роста:



ALONIA™ BIG Grape



ALONIA™ BIG Cherry



ALONIA™ BIG Bicolor Pink Imp.



ALONIA™ BIG Bicolor Purple



ALONIA™ BIG Snow



ALONIA™ BIG Dark Pink



ALONIA™ BIG Indigo

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

ALONIA™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com

ALONIA™

Ангелония узколистная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**30 - 36 см**	**36 - 41 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 20° - 21° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	Обработайте средством широкого спектра Неделя 2

Спецификация аэрозольного орошения - прекратите аэрозольное орошение как можно раньше. Обработайте адъювантом при посадке

-.

- Поддерживайте теплую температуру, позволяющую растениям развиваться.
- Даминозид в концентрации от 1200 до 1500 мг/л .
- Рекомендуется прищипка на 4-й неделе или при пересадке.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется		День посадки	
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется		Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	22° / 23° C	Удобрение от 100 до 150 ч/млн	Не требуется	Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Даминозид по мере необходимости		
Неделя 5	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2		Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

ALONIA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

ALONIA™

Ангелония узколистная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка на 3-й неделе у саженца или при пересадке.
- Посадите саженцы ниже нового слоя почвы для поддержки растений во взрослом состоянии.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
8 - 9 недель	Средняя дневная	Прищипка - да Ночной перерыв или увеличенный световой день - по усмотрению	100 - 150 мг/л азота	На стадиях саженца и созревания
12 см горшок	18 ° - 20 °C			
8 - 10 недель	18 ° - 20 °C		Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,5 - 6,0	
15 см				

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2500 до 3750 мг/л для созревающих растений.
- Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ч/млн для созревания, если необходимо.
- Опрыскайте фунгицидом широкого спектра действия после пересадки.
- Регулярно осматривайте на наличие тли и трипсов.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л		B-9 по мере необходимости	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя 6 - 13	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л .		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л , если необходимо.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

ALONIA™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

ALONIA™

Ангелония узколистная



ALONIA™ Dark Lavender - Фотографии с испытаний в Северной Америке 2020



Атланта (Джорджия)



Ферма Mast Young Plants (Мичиган)



Ферма Raker Robertas (Мичиган)



Университет штата Колорадо



Ферма растений Youngs Plant (Алабама)

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

ALONIA™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

ALONIA™

Ангелония узколистная



ALONIA™ Dark Lavender - Фотографии с испытаний в Северной Америке 2020



Теплицы Metrolina (Северная Каролина)



Университет штата Колорадо



Ферма растений Youngs Plant (Алабама)



Ферма Mast Young Plants (Мичиган)



Ферма Raker Robertas (Мичиган)

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

ALONIA™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com

ALONIA™

Ангелония узколистная



ALONIA™ Big Bicolor Pink - Фотографии с испытаний в Северной Америке 2020



Теплицы Metrolina (Северная Каролина)



Университет штата Колорадо



Ферма растений Youngs Plant (Алабама)



Ферма Mast Young Plants (Мичиган)



Ферма Raker Robertas (Мичиган)

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

ALONIA™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

LOLLIES™

Аргирантемум кустарниковый





LOLLIES™
Buttermint Imp.

- Раннее цветение
- Хорошо подобранная серия 5-ти окрасок
- Высота и ширина в зрелом возрасте:
  30 см x 36 см

Другие сорта серии LOLLIES™:



LOLLIES™
Pink Pez



LOLLIES™
Berry Gummy



LOLLIES™
White Chocolate



LOLLIES™
Marshmallow

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

LOLLIES™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

LOLLIES™

Аргирантемум кустарниковый



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения
Весеннее / летнее цветение

Ширина
30 - 36 см

Высота
30 - 36 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 4 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 125 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.

Свет при размножении для оптимального роста и ускорения времени сбора урожая. Аргирантемум зацветает при длинном световом дне. Даминозид в концентрации 750 ч/млн, неделя 3.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 ч/млн азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,8 - 6,0	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 ч/млн азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,0	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 ч/млн		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,8 - 6,0	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 ч/млн		Даминозид по мере необходимости		

LOLLIES™

Аргирантемум кустарниковый



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка по усмотрению
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
7 - 8 недель	Средняя дневная	Прищипка по усмотрению	100 - 150 ч/мл азота	На стадиях саженца и созревания
12 см горшок	20°- 22° C			
8 - 9 недель	Недели 3 - 5 18° - 20° C	Ночной перерыв или увеличенный световой день - по усмотрению	Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,5 - 6,0	
15 см				

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 750 до 2000 мг/л для молодых созревших растений. - Пропитка паклобутразолом в концентрации 1 мг/л для созревания, если необходимо.
- Обеспечьте постоянный приток воздуха и дайте растениям высохнуть до наступления темноты.
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Темп	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,7 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Растение нейтрального дня	Даминозид по мере необходимости	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя 5 - 13	5,7 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л .		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л , когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

LOLLIES™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

LOLLIES™

Аргирантемум кустарниковый



LOLLIES™- Фотографии с испытаний в Израиле и Северной Америке



Израиль, 2020



HeadStart 2021



Raker 2022



Raker 2022



Израиль, 2020



Израиль, 2020

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

LOLLIES™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™

Череда ферулолистная





Blazing Flames™

- Практически не требуется применение регулятора роста растений
- Новый сорт Blazing Star™ обладает особым узором
- Хорошо подходит для выращивания в горшках 12 см

КОМПАКТНАЯ ПРЯМОРАСТУЩАЯ



Blazing Embers™



Yellow Crown™

НАСЫПНАЯ/ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ



Yellow Splash Imp. ™



Blazing Glory™



Yellow Canary

ПРЯМОРАСТУЩАЯ



Golden Empire™



White Delight ™ Imp.



Pretty In Pink™ Imp.



Sunshine Double™



Blazing Star™

НАСЫПНАЯ



Blazing Fire™



Blazing Ring of Fire™



Blazing Volcano™



Mega Charm™



Yellow Sunshine™

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

BIDENS™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™

Череда ферулолистная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 4 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**20 - 36 см**	**15 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3 - 5 от 100 до 125 ч/млн азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.

Обработайте фунгицидом широкого спектра действия в день посадки для борьбы с болезнью листьев.
Для более рослых сортов опрыскайте даминозидом в концентрации 1500 мг/л в неделю 3.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

BIDENS™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™

Череда ферулолистная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка по усмотрению, возможно на более сильные сорта
- Для высококачественного созревания и оптимальной окраски цветков больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 8 недель	Средняя дневная	Прищипка - рекомендуется Не требуется - растение нейтрального дня	100 - 200 мг/л азота	Даминозид в концентрации от 1500 до 2500 мг/л на более сильные сорта
12 см горшок	18 ° - 20 °C			
7 - 9 недель	1 ч/млн		Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,8 - 6,2	
15 см				
7 - 9 недель	3 ч/млн			
20 см				

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ
	Ризоктония	КВИНТОЦЕН, ТОЛКЛОФОС МЕТИЛ

- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 1500 до 2500 ч/млн для молодых созревших растений - Пропитка паклобутразолом в концентрации 1 ч/млн для созревания, если необходимо для более сильных сортов.
- Обеспечьте постоянный приток воздуха и дайте растениям высохнуть до наступления темноты. Пропитайте растение для защиты от ризоктонии после пересадки и еще раз на стадии созревания.
- Регулярно осматривайте на наличие тли и трипсов.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Даминозид по мере необходимости в концентрации от 1500 до 2500 мг/л	Опрыскайте фунгицидом после пересадки	
Неделя 6 - 12	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 200 ч/млн	Не требуется	Пропитка паклобутразолом в концентрации 1 мг/л, если необходимо.		Пропитка паклобутразолом в концентрации 1 ч/млн, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

BIDENS™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

BIDENS™

Череда ферулолистная



Израиль, 2022



Конклин, 2022







Израиль, 2022



Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

BIDENS™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

EYECONIC™

Калибрахоа гибридная





Сорт EYECONIC™ Orange

- Выведена для получения рисунка с глазком на крупных цветках
- Отлично подходит для создания ярких корзин и композиций
- Зацветает при 10-часовом световом дне
- **Прошла тестирование на чувствительность к pH**
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 36 см

Другие сорта серии EYECONIC™:



EYECONIC™ Cherry Blossom Imp.



EYECONIC™ Pink



EYECONIC™ Strawberry



EYECONIC™ Apricot



EYECONIC™ Peach



EYECONIC™ Compact Sunset



EYECONIC™ Purple

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com

EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**30 - 36 см**	**30 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.

Применение K-IBA может ускорить укоренение. Свет при размножении для оптимального роста и ускорения времени сбора урожая. Даминозид в концентрации от 1200 до 1500 мг/л в день посадки. Баковая смесь даминозида и униконазола-P Неделя 3 для контроля вытягивания, если необходимо.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,2 / 5,8	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,2 - 5,8	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,2 - 5,8	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,2 - 5,8	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 5	5,2 - 5,8	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com

EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка по усмотрению.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
7 - 8 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется Освещение не требуется	100 - 150 мг/л азота	На стадиях саженца и созревания
12 см горшок	18 ° - 20 °C			
8 - 9 недель	18 ° - 20 °C		Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,5 - 6,0	
15 см				
8 - 9 недель				
20 см	3 растения на емкость			
8 - 9 недель				
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 6 Пересадка	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Растение нейтрального дня	Даминозид по мере необходимости	Опрыскайте фунгицидом после пересадки	
Неделя 6 - 12	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л.		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com

EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



Конклин, 2022



Савайя Уотерфорд, 2022





Конклин, 2022



Ферма MYP, 2022



Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DANZIGER

www.danzigeronline.com

LIA™

Калибрахоа гибридная





LIA™ Spark Lavender

- Сорт выведен для выращивания в корзинах
- Зацветает при 10-часовом световом дне
- **Прошла тестирование на чувствительность к pH**
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 36 см



LIA™ Sky Blue



LIA™ Chili Pepper

Сорта серии LIA™:



LIA™ Abstract Lemon Cherry



LIA™ Violet



LIA™ Spark Pink



LIA™ Abstract Pink



LIA™ Blue



LIA™ Bubblegum



LIA™ Dark Red



LIA™ Glaze



LIA™ Melon



LIA™ Raspberry

ТОЛЬКО
ЕС и остальные страны



LIA™ Cranberry

ТОЛЬКО
ЕС и остальные страны



LIA™ Yellow Imp.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

LIA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

LIA™

Калибрахоа гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале.

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**30 - 36 см**	**30 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.

Применение K-IBA может ускорить укоренение. Свет при размножении для оптимального роста и ускорения времени сбора урожая. Даминозид в концентрации от 1200 до 1500 ч/млн в день посадки. Баковая смесь даминозида и униконазола-P Неделя 3 для контроля вытягивания, если необходимо.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,2 / 5,8	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			День посадки	Внесение аэрозольного удобрения
Неделя 2	5,2 - 5,8	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,2 - 5,8	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 ч/млн		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,2 - 5,8	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 ч/млн		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 5	5,2 - 5,8	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 ч/млн	По выбору	Даминозид по мере необходимости	Неделя 5	

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

LIA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

LIA™

Калибрахоа гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка по усмотрению.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
7 - 8 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется Освещение не требуется	100 - 150 ч/мл азота	На стадиях саженца и созревания
12 см горшок	20°- 22° C			
8 - 9 недель	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,5 - 6,0	
15 см				
8 - 9 недель				
20 см				
8 - 9 недель	8 - 9 недель			
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 6 Пересадка	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Растение нейтрального дня	Даминозид по мере необходимости	Опрыскайте фунгицидом после пересадки	
Неделя 6 - 13	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ч/млн.		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ч/млн, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

LIA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

LIA™

Калибрахоа гибридная



Савайя
Уотерфорд, 2022











Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

LIA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

DARLIN’™

Георгина изменчивая





DARLIN’™
Radiant Peach

- Крупные махровые соцветия как с однотонной, так и с двухцветной окраской
- Хорошо подходит для выращивания в горшках 15 см
- Цветет с весны до лета
- Размер в зрелом возрасте: высота 25-30 см
  x ширина
  30 -41 см

Другие сорта серии DARLIN’™:



DARLIN’™
Perfect Red



DARLIN’™
Abstract Fuchsia



DARLIN’™
Orange Flare



DARLIN’™
Salmon



DARLIN’™
White



DARLIN’™
Vintage Rose



DARLIN’™
Radiant Pink



DARLIN’™
Ruby



DARLIN’™
Yellow



DARLIN’™
Burgundy Lace

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

DARLIN’™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

DARLIN’™

Георгина изменчивая



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**30 - 41 см**	**25 - 35 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 125 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения – прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.

- Обработайте фунгицидом широкого спектра действия в день посадки для борьбы с болезнью листьев, включая настоящую мучнистую росу
- Для борьбы с болезнями во время размножения необходимо правильная циркуляция воздуха.
- Ночной перерыв с 22:00 до 2:00 или продление светового дня до 24 часов. Этот режим нужно начать в день посадки с силой света не менее 10 футо-свечей и поддерживать его на протяжении всей жизни саженца/рассады. На 2 недели дольше для горшков размером 25 см и больше.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозидв концентрации 1500 ч/млн по мере необходимости		
Неделя 4	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

DARLIN’™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

DARLIN’™

Георгина изменчивая



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Требуется прищипка, для больших контейнеров - возможно, две прищипки.
- Начните 14-часовые световые дни после пересадки – увеличенный световой день.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 8 недель	Средняя дневная	Для равномерного цветения необходимы длинные световые дни.	150 - 200 мг/л азота	Даминозид по мере необходимости в концентрации 750 мг/л, применять два раза.
12 см горшок	19 ° - 22 °C			
7 - 9 недель	1 растение/горшок		Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,8 - 6,2	
15 см				
8 - 10 недель		Увеличьте световой день до 14 часов		
18 см	1 растение/горшок			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- Опрыскайте для борьбы с настоящей мучнистой росой после пересадки
- Регулятор роста растений - 2-кратное опрыскивание молодых созревших растений даминозидом в концентрации 750 мг/л.
- Регулярно осматривайте на наличие тли, трипсов, паутинного клеща и минирующих мушек.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Требуется	Даминозид по мере необходимости в концентрации 750 ч/млн, применять два раза.	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя 6 - 10	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Требуется		Включая борьбу с настоящей мучнистой росой	

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

DARLIN’™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL SEEKER™

Гелиантус гибридный





SOL SEEKER™
Bronze Burst

- Естественно компактная форма роста
- Ограниченное применение регулятора роста растений
- Высота и ширина в зрелом возрасте
- Sol Seeker Bee Yellow – 91 см на 91 см
- Sol Seeker Bee Yellow – 91 см на 102 см
- Sol Seeker Honey – 102 см на 76 см
- Sol Seeker Bronze Burst – 110 см на 91 см

Другие сорта серии SOL SEKKER™:



SOL SEEKER™
Bee Yellow



SOL SEEKER™
Golden Nectar



SOL SEEKER™
Honey

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL SEEKER™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL SEEKER™

Гелиантус гибридный



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**- 76 - 102 см**	**- 91 - 110 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 20° - 21° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение ближе к вечерним часам, чтобы снизить уровень заболеваемости.
Опрыскайте фунгицидом широкого спектра действия через день после посадки и в 3-ю неделю (в т. ч. для борьбы с настоящей мучнистой росой).

Применение K-IBA может ускорить укоренение. Даминозид в концентрации 1200 мг/л, неделя 4, непосредственно перед пересадкой.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Увеличьте световой день		День посадки	Увеличьте световой день до 12-14 часов
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Увеличьте световой день			
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Увеличьте световой день		Второе использование фунгицида	
Неделя 4	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Увеличьте световой день	Даминозид по мере необходимости		Прищипка при пересадке

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL SEEKER™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL SEEKER™

Гелиантус гибридный



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка при пересадке или через неделю после пересадки.
- Поддерживайте ночную температуру выше 18° C. Более низкие температуры приостановят рост растений, но развитие цветов продолжится.
- Более длинный световой день и высокие температуры ускорят рост.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 8 недель	Средняя дневная	Увеличьте световой день до 12 - 14 часов, если световой день длится меньше 12 часов.	150 - 200 мг/л азота	Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2,000 до 2,500 ч/млн
12 см горшок	65 °18 °C			
8 - 9 недель	18 °C 1 растение на емкость		Электропроводность почвы 1,0 - 1,5 pH 5,7 - 6,3	
15 см				
8 - 9 недель				
20 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- Опрыскайте для борьбы с настоящей мучнистой росой.
- Температура - ключевой фактор для поддержания правильного роста. Необходима температура выше 18° C.
- Увеличение светового дня до 12-14 часов при коротком световом дне.
- Регулярно осматривайте на наличие тли и трипсов.
- Пропитка почвы паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания, если необходимо.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 6 Пересадка	5,7 - 6,3	1,0 - 1,2		Удобрение от 100 до 150 мг/л	См. выше	Даминозид по мере необходимости	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя 6 - 13	5,7 - 6,3	1,0 - 1,5		Удобрение от 150 до 200 мг/л		Пропитка паклобутразолом в концентрации 1 мг/л		Пропитка паклобутразолом в концентрации 1 ч/млн, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL SEEKER™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL LUNA PRIME™

Недотрога Новая Гвинея





SOL LUNA PRIME™ Peach

- Одинаково хорошо переносит солнце и тень
- Можно сажать в любом месте и получить аккуратный шар яркой окраски
- Компактная, хорошо подобранная серия, простая в выращивании и надежная в производстве
- Идеально подходит для упаковок и горшков премиум класса, прекрасно заполнит 15-см горшок
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 46 см

Другие сорта серии SOL LUNA PRIME™:



SOL LUNA PRIME™ Pearl



SOL LUNA PRIME™ Orchid



SOL LUNA PRIME™ Light Salmon



SOL LUNA PRIME™ Red



SOL LUNA PRIME™ White

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL LUNA PRIME™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL LUNA PRIME™

Недотрога Новая Гвинея



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**30 - 36 см**	**30 - 46 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 20° - 21° C		Недели 3-5 80 мг/л азота	Обработайте средством широкого спектра. Неделя 2

Опрыскайте адъювантом при посадке.

- Опрыскайте этефоном в концентрации 300 ч/млн день спустя после посадки. Благодаря этому возобновится цветение. Одного часа воздействия этефона на листья будет достаточно, затем он испарится.
- Поддерживайте теплую температуру, позволяющую растениям развиваться и цвести.
- Средняя дневная температура 21° C.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	6,0 / 6,5	0,50	22° / 23° C		Не требуется		День посадки	
Неделя 2	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется		Второе использование фунгицида	
Неделя 3	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° C	80 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется			
Неделя 4	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° C	80 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется			
Неделя 5	6,0 / 6,5	0,80 - 0,90	22° / 23° C	80 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Не требуется			Прищипка не рекомендуется

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL LUNA PRIME™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

SOL LUNA PRIME™

Недотрога Новая Гвинея



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Поддерживайте низкий уровень электропроводности почвы для правильного роста и размера растения.
- Пересаживайте саженцы, когда растения укоренились и активно растут.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
7 - 8 недель	Средняя дневная	Прищипка - нет Растение нейтрального дня	100 - 125 мг/л азота	При необходимости опрыскайте юниконазолом в концентрации 5–7 мг/л в начале урожая- Пропитайте паклобутразолом в концентрации 0,5 ч/млн в течение 3 недель после созревания.
12 см горшок	20 ° - 21 °C			
8 - 9 недель	20 ° - 21 °C		Электропроводность почвы 0,8 - 1,0 pH 6,0 - 6,5	
15 см				

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- Регулятор роста растений - опрыскайте юниконазолом в концентрации от 5 до 7 мг/л в начале урожая.

Пропитка паклобутразолом в концентрации от 0.5 до 2 мг/л для созревания.

- Опрыскайте фунгицидом широкого спектра действия после пересадки.
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Опрыскивание юниконазолом	Пропитайте фунгицидом при пересадке	
Неделя 6 - 13	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Пропитка паклобутразолом в концентрации 0,5 мг/л		Перед применением регулятора роста позвольте растениям достичь 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL LUNA PRIME™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

AMORE®

Петуния гибридная





AMORE® King of Hearts Imp.

- Оригинальный узор в форме сердца на каждом цветке
- Раннее цветение, насыпная форма роста
- Великолепно подходит для горшков, корзин и создания композиций
- Уникальный сорт, привлекателен как для розничного торговца, так и конечного потребителя
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 30 см

Другие сорта серии AMORE®:



AMORE® Princess



AMORE® Queen of Hearts



AMORE® Pink Hearts



AMORE® Purple



Сорт AMORE® Heart & Soul



AMORE® Fluttering Heart



AMORE® Fiesta



AMORE® Joy

ТОЛЬКО
ЕС и остальные страны

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

AMORE™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

AMORE®

Петуния гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**36 – 46 см**	**30 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно раньше.

Сорта этой серии хорошо ветвятся, поэтому для качественного созревания прищипка не требуется. Даминозид в концентрации 1500 ч/млн день спустя после посадки. Неделя 4 – баковая смесь даминозида в концентрации 2500 ч/млн и юниконазола в концентрации 10 ч/млн, если растения растут агрессивно. Сорта Amore® Fiesta, Heart & Soul и Queen of Heart обладают самой высокой силой роста среди сортов серии.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Дополнительное освещение по усмотрению, в зависимости от региона	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	
Неделя 2	5,6 - 6,0	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,6 - 6,0	0,90 - 1,0	Охладите до 20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид @ в концентрации 2500 мг/л		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

AMORE™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

AMORE®

Петуния гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Поддерживайте более низкий уровень pH для оптимальной доступности железа (Fe) и марганца (Mn) для растений.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 7 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется Дополнительное освещение по усмотрению, в зависимости от региона	100 - 150 мг/л азота	Стадия созревания Даминозид @ в концентрации 2500 to 3200 мг/л
12 см горшок	20°- 22° C			
8 - 9 недель			Электропроводность почвы 1,2 - 1,5 pH 5,6 - 6,0	
15 см				
8 - 10 недель				
20 см	3 растения на емкость			
8 - 10 недель				
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2500 до 3200 мг/л и/или пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания, если необходимо.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Опрыскивание даминозидом	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя от 5 до 15	5,6 - 6,0	1,2 - 1,5	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до мг/л.		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

AMORE™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |


CAPELLA™

Петуния гибридная





CAPELLA™ Fuchsia Lace



- Идеальная петуния – хорошо подходит для размножения, выращивания в теплицах, А ТАКЖЕ ДЛЯ конечного потребителя
- Имеющий естественно регулируемую форму роста, сорт был выведен для выращивания в 12 см горшках, но петуния этого сорта легко заполнит и горшки большего размера
- Зацветает довольно рано для любого рынка
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 25 см x 30 см

Другие сорта серии CAPELLA™:



CAPELLA™ Pink Morn



CAPELLA™ Magenta Diamond



CAPELLA™ Rim Raspberry



CAPELLA™ Salmon Imp.



CAPELLA™ Rim Fuchsia



CAPELLA™ Indigo Imp.



CAPELLA™ White Imp.



CAPELLA™ Ruby Red Imp.



CAPELLA™ Hello Yellow



CAPELLA™ Rose



CAPELLA™ Coral



CAPELLA™ Sangria



CAPELLA™ Baby Pink



CAPELLA™ Burgundy



CAPELLA™ Mulberry



CAPELLA™ Cherry Vanilla



CAPELLA™ Neon Pink



CAPELLA™ Pink Lace



CAPELLA™ Purple



CAPELLA™ Purple Veins



CAPELLA™ Salmon

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CAPELLA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

CAPELLA™

Петуния гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**20 – 25 см**	**25 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно раньше.

Сорта этой серии хорошо ветвятся, поэтому для качественного созревания прищипка не требуется. Даминозид в концентрации 1500 ч/млн день спустя после посадки. Неделя 4 - даминозид @ в концентрации 2000 to 2500 ч/млн

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Дополнительное освещение не требуется	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	
Неделя 2	5,6 - 6,0	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,6 - 6,0	0,90 - 1,0	Охладите до 20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Опрыскивание даминозидом в концентрации @ 2000 - 2500 мг/л		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CAPELLA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

CAPELLA™

Петуния гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Поддерживайте более низкий уровень pH для оптимальной доступности железа (Fe) и марганца (Mn) для растений.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 7 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется Дополнительное освещение не требуется	150 - 200 мг/л азота	На стадиях саженца и созревания Даминозид в концентрации @ 2000 - 2500 мг/л
12 см горшок	20°- 22° C			
8 - 9 недель			Электропроводность почвы 1,2 - 1,5 pH 5,6 - 6,0	
15 см				
8 - 10 недель				
20 см	3 растения на емкость			
8 - 10 недель				
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2000 до 2500 ч/млн и/или пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания, если необходимо.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Опрыскивание даминозидом	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя от 5 до 15	5,6 - 6,0	1,2 - 1,5	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л, когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CAPELLA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

CASCADIAS™

Петуния гибридная





CASCADIAS™
Lilac Frost

- В наличии множество уникальных узоров и окрасок цветков
- Раннее цветение, стелющаяся форма роста
- Отлично подходит для создания ярких корзин премиум класса
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 36 см x 46 см

Сорта серии CASCADIAS™:



CASCADIAS™
Fuchsia Gem



CASCADIAS™
Fantasy Hot Pink



CASCADIAS™
Rose



CASCADIAS™
Arizona Sky



CASCADIAS™
Rim Cherry Imp.



CASCADIAS™
Fuchsia



CASCADIAS™
Passion



CASCADIAS™
Indigo



CASCADIAS™
Rim Violet Imp



CASCADIAS™
Bright Red



CASCADIAS™
Red



CASCADIAS™
Blue Imp.



CASCADIAS™
Purple Lace



CASCADIAS™
Hint of Lime



CASCADIAS™
Iceberg

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CASCADIAS™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

CASCADIAS™

Петуния гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**36 – 46 см**	**30 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1- 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/лазота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно раньше.

Сорта этой серии хорошо ветвятся, поэтому для качественного созревания прищипка не требуется. Даминозид в концентрации 1500 мг/л день спустя после посадки. Неделя 4 – смесь даминозида @ в концентрации 2500 мг/л, если растения растут агрессивно.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Дополнительное освещение по усмотрению, в зависимости от региона	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	
Неделя 2	5,6 - 6,0	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,6 - 6,0	0,90 - 1,0	Охладите до 20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Опрыскивание даминозидом в концентрации 2500 мг/л, если необходимо.		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CASCADIAS™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

CASCADIAS™

Петуния гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Поддерживайте более низкий уровень pH для оптимальной доступности железа (Fe) и марганца (Mn) для растений.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 7 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется Дополнительное освещение по усмотрению, в зависимости от региона	150 - 200 мг/л азота	Стадия созревания - Даминозид @ в концентрации 2500 мг/л
12 см горшок	20°- 22° C			
8 - 9 недель			Электропроводность почвы 1,2 - 1,5 pH 5,6 - 6,0	
15 см				
8 - 10 недель				
20 см	3 растения на емкость			
8 - 10 недель				
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2500 до 3000 ч/млн и/или пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 ч/млн для созревания, если необходимо.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Баковая смесь/ даминозида/юниконазола, если необходимо	Опрыскайте фунгицидом после пересадки	
Неделя от 5 до 15	5,6 - 6,0	1,2 - 1,5	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л , когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CASCADIAS™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

VANESSA™ COMPACT

Вербена x гортензия





VANESSA™ COMPACT
Bordeaux

- Прошла тестирование на устойчивость к плесени и стойкость окраски
- Эта разновидность сорта улучшенной Vanessa имеет естественно регулируемую форму роста
- Требуется от небольшого количества регулятора роста растений до его полного отсутствия
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 25 см x 30 см

Другие сорта серии VANESSA™ COMPACT :



VANESSA™ COMPACT
Violet



VANESSA™ COMPACT
White



VANESSA™ COMPACT
Rosa



VANESSA™ COMPACT
Bicolor Purple



VANESSA™ COMPACT
Bicolor Rose



VANESSA™ COMPACT
Deep Pink



VANESSA™ COMPACT
Bordeaux



VANESSA™ COMPACT
Lime



VANESSA™ COMPACT
Neon Pink



VANESSA™ COMPACT
Optik Lavender



VANESSA™ COMPACT
Pink



VANESSA™ COMPACT
Red

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

VANESSA™ COMPACT **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

VANESSA™ COMPACT

Вербена x гортензия



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**25 – 36 см**	**15- 20 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Не требуется	Недели 1- 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 4 18° - 21° C		Недели 3-4 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно раньше.

Обработайте растение адъювантом при посадке. Даминозид в концентрации 2000 ч/млн день спустя после посадки.
Для получения отличного саженца прищипка не требуется.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Растение нейтрального дня	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	Внесение аэрозольного удобрения
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

VANESSA™ COMPACT **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

VANESSA™ COMPACT

Вербена x гортензия



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Вербена хорошо реагирует на отрицательный DIF для контроля высоты.
- Verbena Vanessa™ является раннецветущим растением.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
5 - 6 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется Растение нейтрального дня	150 - 200 мг/л азота	Даминозид @ в концентрации 2500 мг/л для созревания Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания
12 см горшок	16°- 20° C			
6 - 7 недель			Электропроводность почвы 1,0 - 1,5 pH от 5,8 до 6,2	
15 см				
От 7 до 8 недель				
20 см	3 растения на емкость			
7 - 8 недель				
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом для контроля высоты/ Пропитка паклобутразолом для созревания.
- Регулярно осматривайте на наличие тлей, листоверток, трипсов и белокрылок.

10	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид @ в концентрации 2500 мг/л по мере необходимости.	Смочите фунгицидом после пересадки.	
Неделя от 5 до 12	5,8 - 6,2	1,2 - 1,5	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Пропитка паклобутразолом @ в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания		Пропитка паклобутразолом, когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

VANESSA™ COMPACT **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

PANAMA™

Эхинацея гибридная





CAPELLA™ Rose



PANAMA™ Red

- Морозостойкость 5 - 9
- Яровизации или охлаждения не требуется (первый год цветения)
- Естественное время цветения в июне
- Первая эхинацея вегетативного размножения неукорененными черенками
- Высота и ширина в зрелом возрасте 35 см x 41 см

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

PANAMA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

PANAMA™

Эхинацея гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения **Весеннее / летнее цветение**

Ширина **36 - 41 см**

Высота **30 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1- 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 65° - 68° C		Недели 3-5 от 100 до 125 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– опрыскайте адъювантом в день посадки / прекратите аэрозольное орошение как можно раньше

Опрыскивание средством K-IBA способствует быстрому и равномерному укоренению. Echinacea Panama™ - растение длинного дня, его естественное время цветения приходится на июнь (условно длиннодневное растение).
Подходящий субстрат для молодых растений с pH от 5,8 до 6,5 и электропроводностью 0,8 мСм.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	21 / 22 C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Необходимая продолжительность светового дня 12 часов		День посадки	
Неделя 2	5,6 - 6,0	0,80 - 0,90	21 / 22 C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	20 - 21 C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 5	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	20 - 21 C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		От 1500 до 2000 мг/лдами нозида

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

PANAMA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

PANAMA™

Эхинацея гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка не требуется
- Естественно компактная форма роста
- Спрей от бактериального ожога листьев

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
8 - 10 недель	Средняя дневная (20°- 21° C)	Прищипка не требуется/для раннего цветения увеличьте продолжительность светового дня до 12 часов.	100 - 150 ч/мл азота	Опрыскивание даминозидом @ 2000 – 2500 мг/л
15 см			Электропроводность почвы 0,8 - 1,2 pH 5,8 - 6,2	
8 - 10 недель	3 растения на емкость			
20 см				

		Рекомендуемые химикаты
Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- Цветение при длинном световом дне. Естественный период цветения — недели 24 - 27.
- Регулятор роста растений - При необходимости опрыскивайте даминозидом в концентрации от 2000 до 2500 мг/л для созревших растений в начале графика сбора урожая.
- Обеспечьте постоянный приток воздуха и дайте растениям высохнуть до наступления темноты/Спрей от бактериального ожога листьев.
- Пропитайте после пересадки от ризоктониоза и питиозной гнили / фитофторы

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 6 Пересадка	5,8 - 6,2	0,8 - 1,0	20°- 21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости	Пропитайте фунгицидом после пересадки	Борьба с питиозной гнилью и фитофторой
Неделя от 6 до 13	5,8 - 6,2	0,8 - 1,2	20°- 21° C	Удобрение от 150 до 200 мг/л			Опрыскайте фунгицидом.	Борьба с бактериальным ожогом листьев

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

PANAMA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

GUATEMALA™

Эхинацея гибридная





Guatemala™ Papaya



Guatemala™ Gold

- Морозостойкость 5 - 9
- Яровизации или охлаждения не требуется (первый год цветения)
- Естественное время цветения в июне
- Вторая эхинацея вегетативного размножения неукорененными черенками
- Высота и ширина в зрелом возрасте 20 см x 36 см

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

GUATEMALA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com

GUATEMALA™

Эхинацея гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	18 - 26 см	30 - 38 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 125 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– опрыскайте адъювантом в день посадки / прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.

Опрыскивание средством K-IBA способствует быстрому и равномерному укоренению. Echinacea Panama™ - растение длинного дня, его естественное время цветения приходится на июнь (условно длиннодневное растение).
Подходящий субстрат для молодых растений с pH от 5,8 до 6,5 и электропроводностью 0,8 мСм.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	21 / 22 C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Необходимая продолжительность светового дня 12 часов		День посадки	
Неделя 2	5,6 - 6,0	0,80 - 0,90	21 / 22 C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	20 - 21 C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 5	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	20 - 21 C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		От 1500 до 2000 мг/л даминозида

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

GUATEMALA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

GUATEMALA™

Эхинацея гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка не требуется
- Естественно компактная форма роста
- Опрыскивание от бактериального ожога листьев

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
8 - 10 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется/для раннего цветения увеличьте продолжительность светового дня до 12 часов.	100 - 150 мг/л азота	Опрыскивание даминозидом @ 2000 – 2500 мг/л
15 см	(20°- 21° C)			
8 - 10 недель	3 растения на емкость		Электропроводность почвы 0,8 - 1,2 pH 5,8 - 6,2	
20 см				

		Рекомендуемые химикаты
Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- Цветение при длинном световом дне. Естественный период цветения — недели 24 - 27.
- Регулятор роста растений - При необходимости опрыскивайте даминозидом в концентрации от 2000 до 2500 мг/л для созревших растений в начале графика сбора урожая.
- Обеспечьте постоянный приток воздуха и дайте растениям высохнуть до наступления темноты/Спрей от бактериального ожога листьев.
- Пропитайте после пересадки от ризоктониоза и питиозной гнили / фитофторы.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 6 Пересадка	5,8 - 6,2	0,8 - 1,0	20°- 21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости	Пропитайте фунгицидом после пересадки	Борьба с питиозной гнилью и фитофторой
Неделя 6 - 13	5,8 - 6,2	0,8 - 1,2	20°- 21° C	Удобрение от 150 до 200 мг/л			Опрыскивание фунгицидом.	Борьба с бактериальным ожогом листьев.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

GUATEMALA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

GUATEMALA™

Эхинацея гибридная



Израиль, ноябрь 2022



Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

GUATEMALA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |