



新几内亚凤仙花  
(最佳12厘米/6英寸)

	pH	Ec	最低温度 F	最高温度 F	最低温度 C	最高温度 C	修剪	施肥	光照	PGR	除菌	备注
生根												
第1周 单元扦插	6.0 - 6.5	0.80	72	74	22	23	无修剪		光期钝感		扦插当日施加 Daconil (百菌清)	
第2周	6.0 - 6.5	.80 - .90	72	74	22	23	无修剪		光期钝感		二次施加 Daconil	
第3周	6.0 - 6.5	.80 - .90	72	74	22	23	无修剪	施肥 65 - 80 ppm N	光期钝感			
第4周	6.0 - 6.5	.80 - .90	68	72	20	22	无修剪	施肥 65 - 80 ppm N	光期钝感	Bonzi 或 Sumagic		
第6周 上盆移栽	6.0 - 6.5	.80 - .90	68	72	20	22	无修剪	施肥 65 - 80 ppm N	光期钝感			
第6-14周	6.0 - 6.5	.80 - .90	68	72	20	22	无修剪	施肥 65 - 80 ppm N	光期钝感			浸泡 Bonzi (如需要), 浓度按 1 ppm 的1/4

可在无根切枝扦插后当日喷洒300 ppm Florel (乙烯利)。这样可以重置花期。  
Florel喷雾仅需1个小时就可生效。