

BIDENS

	pH	Ec	Min Temp F	Max Temp F	Min TEMP C	Max TEMP C	Kneifen	Füttern	Licht	PGR	Fungizid	Kommentare
Wurzelbildung												
Woche 1 haftende Einlage 1 pro Zelle	5,8 bis 6,2	0,80	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel		B-9 3750 PPM	Daconil Tag des Stechens	B-9 Day nach Stechen
Woche 2	5,8 bis 6,2	,80 bis ,90	72	74	22	23		50 ppm N im Nebel			Zweite Anwendung Daconil	
Woche 3	5,8 bis 6,2	,80 bis ,90	68	72	20	22	Kneifen	65 bis 80 ppm N füttern		B-9 Arest		B-9 Arest nach Bedarf
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	65	68	18	20		100 bis 200 ppm N füttern				
Woche 5 Umpflanzung 3 pro 10 bis 12	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	65	68	18	20		100 bis 200 ppm N füttern				
Woche 6 bis 10	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	65	68	18	20		100 bis 200 ppm N füttern				

