

Brachyscome
BRASCO (Qt)

| | Ph | Ec | Min Temp F | Max Temp F | Min TEMP C | Max TEMP C | Kneifen | Füttern | Licht | PGR | Fungizid | Kommentare |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Wurzelbildung | | | | | | | | | | | | |
| Woche 1 haftende Einlage 2 pro c | 5,6 bis 6,2 | 0,80 | 72 | 74 | 22 | 23 | | 50 ppm N im Nebel | Nicht Benötigt | | Daconil Tag des Stechens | |
| Woche 2 | 5,6 bis 6,2 | ,80 bis ,90 | 72 | 74 | 22 | 23 | | 50 ppm N im Nebel | Nicht Benötigt | | Zweite Anwendung Daconil | |
| Woche 3 | 5,6 bis 6,2 | ,90 bis 1,0 | 72 | 74 | 22 | 23 | Diese Woche Kneifen | 100 bis 150 ppm füttern | Nicht Benötigt | | | Diese Woche Kneifen |
| Woche 4 | 5,6 bis 6,2 | ,90 bis 1,0 | 65 | 68 | 18 | 20 | | 100 bis 150 ppm füttern | Nicht Benötigt | B-9 WENN Benötigt | | B-9 3750 ppm wenn benötigt |
| Woche 5 Umpflanzung1 pro Topf | 5,6 bis 6,2 | ,90 bis 1,0 | 65 | 68 | 18 | 20 | | 100 bis 150 ppm füttern | Nicht Benötigt | B-9 WENN Benötigt | | |
| Woche 6 bis 12 | 5,6 bis 6,2 | ,90 bis 1,0 | 65 | 68 | 18 | 20 | | 100 bis 150 ppm | Nicht Benötigt | B-9 WENN Benötigt | | |

