

PAZZAZ™

Portulaca oleracea



PAZZAZ™ Bright Purple

- Moderate trailing habit that works well for gallon and hanging basket production
- Perfect for heat tolerant/drought tolerant programs
- Available in a wide array of vibrant colors
- Mature height and width is 12 inches x 14 inches (30cm x 36cm)

PROPAGATION TIPS:

- Stick on priority
- **NA:** Spray Daconil the day of sticking
- **EU&ROW:** Apply a preventative spray for Botrytis
- Mist to keep turgid and keep soil temp at 72-74F (23C) until roots form then lower to 68F (20C)
- Remove from mist as soon as possible
- **NA:** B-9 or B-9/Arest tank mix can be effective to control unwanted growth. **EU& ROW:** Daminozide spray can be effective to control unwanted growth.

FINISHING TIPS:

- Day of transplanting: **NA:** Spray Daconil and water in thoroughly to activate starter charge in soil.
- **EU&ROW:** Apply a preventative spray for Botrytis
- Feed at 100 to 150 ppm N as needed
- Paclobutrazol drench at 1 ppm can be effective to control unwanted growth

Container Size Schedule @ADT of 68°F (20°C)	Total weeks from stick to finish
Quart 12-15 cm pot	12 weeks
Gallon 15-18 cm pot	12 weeks
8" / 20 cm at 1 ppp	12 weeks
10" / 25 cm at 3 ppp	12 weeks

Other top selling varieties in the PAZZAZ™ series:



PAZZAZ™ Apricot



PAZZAZ™ Pink Glow



PAZZAZ™ Red Flare



PAZZAZ™ Tangerine



PAZZAZ™ Yellow imp.

For additional technical growing information:

PAZZAZ™ [CLICK HERE](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

PAZZAZ™

Portulaca oleracea



PAZZAZ™ Bright Purple

- Portamento moderatamente prostrato che ben si presta a contenitori da un gallone e per la produzione di cesti pensili
- Perfetto per progetti che richiedono tolleranza al calore e alla siccità
- Disponibile in una vasta gamma di sgargianti colori
- La pianta adulta misura H cm. 30 x L cm. 36

CONSIGLI PER LA PROPAGAZIONE:

- Alloggiare secondo priorità
America del Nord: Il giorno dell'alloggiamento irrorare con Daconil
Unione Europea e Resto del Mondo: Vaporizzare con spray atto a prevenire la botrite
- Nebulizzando per conservare la turgidezza, mantenere la temperatura del terriccio a 23°C fino alla radicazione, poi scendere a 20°C
- Eliminare la nebulizzazione non appena possibile
- Per controllare la crescita indesiderata può essere efficace B-9 o B-9/Arest tank mix.

CONSIGLI PER LA FINITURA:

- Il giorno del trapianto:
America del Nord: Irrorare accuratamente con Daconil e acqua per attivare lo starter nel terriccio
Unione Europea e Resto del Mondo: Vaporizzare con spray atto a prevenire la botrite
- Alimentare con N da 100 a 150 ppm N secondo necessità
- Per controllare la crescita indesiderata può essere utile saturare con Paclobutrazol 1 ppm

Tabella dimensioni dei recipienti ad una Temperatura Diurna Media di 20°C

Totale settimane dall'alloggiamento alla pianta finita

Vasi da un quarto cm. 12-15	12 settimane
Vasi da un gallone cm. 15-18	12 settimane
Vasi 8" / cm. 20 con 1 piantina ciascuno	12 settimane
Vasi 10" / cm. 25 con 3 piantine ciascuno	12 settimane


Altre varietà più vendute della gamma PAZZAZ™:




PAZZAZ™ Apricot



PAZZAZ™ Pink Glow



PAZZAZ™ Red Flare



PAZZAZ™ Tangerine



PAZZAZ™ Yellow imp.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla coltura:

PAZZAZ™ CLICCAREQUI



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

PAZZAZ™

Portulaca oleracea



PAZZAZ™ Bright Purple

- Mäßig hängende Wuchsform, die sich gut für die Topf- und Blumenampelproduktion eignet
- Perfekt für hitze- und trockenheitstolerante Programme
- Erhältlich in einer großen Auswahl an leuchtenden Farben
- Reife Höhe und Breite ist 30 cm x 36 cm

VERMEHRUNGSTIPPS:

- Priorität einhalten.
- NA: Daconil am Tag des Stechens sprühen
EU&ROW: Vorbeugendes Spray gegen Botrytis anwenden
- Düngen, um die Pflanze prall zu halten und die Bodentemperatur bei 23°C zu halten, bis sich Wurzeln bilden, dann auf 20°C senken
- So schnell wie möglich aus dem Dünger entfernen

TIPPS ZUR FERTIGSTELLUNG:

- NA: Daconil sprühen und gründlich einwässern, um die Starterladung im Boden zu aktivieren.
EU&ROW: Vorbeugendes Sprühen gegen Botrytis anwenden
- Bei Bedarf mit 100 bis 150 ppm N düngen
- Paclobutrazol-Drench bei 2 ppm kann wirksam sein, um unerwünschten Wuchs zu kontrollieren

Behältergrößen-Tabelle @ ADT von 20 °C	Wochen gesamt vom Stock bis zum Ergebnis
12-15 cm Topf	12 Wochen
15-18 cm Topf	12 Wochen
20 cm Topf bei 1 ppp	12 Wochen
25 cm Topf bei 3 ppp	12 Wochen

Weitere Sorten der PAZZAZ™ -Serie:



PAZZAZ™ Apricot



PAZZAZ™ Pink Glow



PAZZAZ™ Red Flare



PAZZAZ™ Tangerine



PAZZAZ™ Yellow imp.

Für zusätzliche technische Wachstumsinformationen:

PAZZAZ™ [CLICK HERE](#)



DANZIGER

www.danzigeronline.com | [YouTube](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#)

PAZZAZ™

スベリヒコ



PAZZAZ™ ブライトパープル

- 緩やかなトレーリングで、ガロンやハンギングバスケットを作るのに適しています
- 暑さに強い、また干ばつに強いプログラムに最適です
- 鮮やかなカラーバリエーションが揃っています
- 成長しきった高さと幅は12インチx14インチ (30cm×36cm)です

繁殖させるためのヒント:

- 細枝の優先度
- **北アメリカ:** 植え付け日にダコニールを散布
欧州とその他の国: ボトリチス病予防スプレーを塗布します
- 水を霧状に吹き付け、根が形成されるまで土壌温度を23°C (72 - 74°F)に保ち、その後20°C (68°F)まで下げます
- 速やかに霧から離します
- B-9またはB-9/アレスト・タンクミックスを使用すれば、不要な生育を抑制するのに効果的です

仕上げるのヒント:

- 植え替えの日: **北アメリカ:** ダコニールを散布した後、十分に水を含ませ、土壌中のスターター充填を活性化させます。
欧州とその他の国: ボトリチス病予防スプレーを塗布します
- 必要に応じて 100 から 150 ppm N 与えます
- パクロブトラゾールを1ppmの濃度で散布すると、不要な生育を抑制するのに効果的です

容器サイズ一覧表 ADT 68°F (20°C) の場合	合計週数 細枝から仕上げまで
クォート 12~15cmのポット	12週
ガロン 15~18cmのポット	12週
1ppp で 8インチ/20cm	12週
3ppp で 10インチ/25cm	12週

PAZZAZ™ シリーズのその他の売れ筋品種:



PAZZAZ™ アプリコット



PAZZAZ™ ピンクグロー



PAZZAZ™ レッドフレア



PAZZAZ™ タンジェリン



PAZZAZ™ イエロー改良版

その他の技術的な発育情報については、こちらをご覧ください:

PAZZAZ™ ここをクリック



DANZIGER

www.danzigeronline.com |



PAZZAZ™

Portulaca oleracea



PAZZAZ® Púrpura brillante

- Hábito de arrastre moderado que rinde bien para la producción de recipientes de un galón y canastas colgantes
- Perfecta para programas de tolerancia al calor / tolerancia a la sequía
- Disponible en una amplia gama de vibrantes colores
- Cuando madura, alcanza una altura y un ancho de 12 x 14 pulgadas (30 x 36 cm)

RECOMENDACIONES PARA LA PROPAGACIÓN:

- Plantar rápidamente
- **NA:** Rociar Daconil el día de la plantación.
EU&ROW: Aplicar un aerosol preventivo contra la botrytis
- Rociar la planta con agua para mantenerla turgente y para mantener la temperatura del suelo a 72-74 °F (23 °C) hasta que se formen las raíces, luego bajarla a 68 °F (20 °C)
- Retirar la planta del rocío lo más rápido posible
- La mezcla de tanque B-9 o B-9/Arest puede ser eficaz para controlar el crecimiento no deseado

RECOMENDACIONES DE CULTIVO:

- Día del trasplante: **NA:** Rociar Daconil y regar abundantemente para activar la carga del iniciador en la tierra. **EU&ROW:** Aplicar un aerosol preventivo contra la botrytis
- Administrar N de 100 a 150 ppm, según sea necesario
- Empapar la planta con paclobutrazol a 1 ppm puede ser eficaz para controlar el crecimiento no deseado

Tabla de tamaños de recipiente a TDP de 68 °F (20 °C)

Cant. total de semanas desde el plantado hasta el final del cultivo

Cuarto Maceta de 12-15 cm	12 semanas
Galón Maceta de 15-18 cm	12 semanas
8" / 20 cm a 1 ppp	12 semanas
10" / 25 cm a 3 ppp	12 semanas

Otras de las variedades más vendidas de la serie PAZZAZ®:



PAZZAZ®
Albaricoque



PAZZAZ®
Rosa brillante



PAZZAZ®
Rojo resplandor



PAZZAZ®
Mandarina



PAZZAZ®
Amarillo

Para obtener más información técnica sobre el crecimiento:

HAZ CLIC AQUÍ PAZZAZ®



DANZIGER

www.danzigeronline.com |   

PAZZAZ™

Portulaca oleracea



PAZZAZ™ Violet Vif

- Port rampant modéré qui fonctionne bien pour la production de gallons et de paniers suspendus
- Parfait pour les programmes de tolérance à la chaleur/à la sécheresse
- Disponible dans une large gamme de couleurs vives
- La hauteur et la largeur à maturité sont de 12 pouces x 14 pouces (30 cm x 36 cm)

CONSEILS DE PROPAGATION :

- Piquet de support en priorité
- **NA** : Vaporiser Daconil le jour de l'adhésion
- **EU&ROW** : Appliquer un spray préventif pour Botrytis
- Vaporiser pour maintenir la turgescence et maintenir la température du sol à 72-74F (23C) jusqu'à ce que les racines se forment, puis baisser à 68F (20C)
- Retirer la vapeur dès que possible
- Le mélange en réservoir B-9 ou B-9 / Arest peut être efficace pour contrôler la croissance indésirable.

CONSEILS DE FINITION :

- Jour de la transplantation : **NA** : Vaporiser Daconil et de l'eau en profondeur pour activer la charge de démarrage dans le sol.
- **EU&ROW** : appliquer un spray préventif pour Botrytis
- Nourrir de 100 à 150 ppm N selon les besoins
- Un arrosage au paclobutrazol à 2 ppm peut être efficace pour contrôler la croissance indésirable

Calendrier de la taille du contenant @ADT de 68°F (20°C)

Nombre total de semaines du piquet jusqu'à la fin

Quart | Pot de 12-15 cm

12 semaines

Gallon | Pot de 12-15 cm

12 semaines

8" / 20 cm à 1 ppp

12 semaines

10" / 25 cm à 3 ppp

12 semaines

Autres variétés les plus vendues de la série PAZZAZ™ :



PAZZAZ™ Abricot



PAZZAZ™ Lueur Rose



PAZZAZ™ Lueur Rouge



PAZZAZ™ Mandarine



PAZZAZ™ Jaune imp.

Pour plus d'informations techniques sur la croissance :

PAZZAZ™ CLIQUEZ ICI



DANZIGER

www.danzigeronline.com |   

PAZZAZ™

Портулак огородный



PAZZAZ™ Ярко-фиолетовый

- Умеренно ползучая форма, одинаково хорошо пригодная для выращивания в горшках размером 15-18 см и подвесных кашках
- Идеально подходит для жаро-/засухоустойчивых программ
- Множество ярких расцветок
- Высота и ширина взрослого растения: 30 см x 36 см

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ:

- Высаживайте в порядке очередности
- **СА:** Нанесите спрей Daconil в день высаживания
ЕС и остальные страны: Нанесите профилактический спрей от серой гнили
- Опрыскивайте для роста растений и поддерживайте температуру почвы на уровне 23 °C, пока не сформируются корни; затем понизьте температуру до 20 °C
- Сразу убирайте растения из влажной среды
- Баковая смесь В-9 или В-9/Arest может быть полезна для контроля нежелательного роста растений.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ:

- В день пересадки: **СА:** Нанесите спрей Daconil и полейте большим количеством воды для активации содержащегося в грунте удобрения.
ЕС и остальные страны: Нанесите профилактический спрей от серой гнили
- Давайте подкормку в объёме от 100 до 150 ppm N по мере необходимости
- Смачивание паклбутразолом в объёме 1 ppm может быть полезно для контроля нежелательного роста растений

Перечень размеров горшков @ среднесуточной температуре 20 °C	Неделя (всего) от посадки до обработки выросшего растения
Горшок 12-15 см	12 недель
Горшок 15-18 см	12 недель
20 см для 1 растения на горшок	12 недель
25 см для 3 растений на горшок	12 недель

Другие сорта — лидеры продаж — в серии PAZZAZ™:



PAZZAZ™
Абрикос



PAZZAZ™ Светящийся
розовый



PAZZAZ™ Красная
вспышка



PAZZAZ™ Мандарин



PAZZAZ™ Жёлтая
имп.

Для получения дополнительной технической информации по выращиванию растений:

MEGA PAZZAZ™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |

