


EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



Сорт EYECONIC™ Pink



- Выведен в дополнение к серии с глазком на крупном цветке
- Отлично подходит для создания ярких корзин и композиций
- Зацветает при 10-часовом световом дне
- Прошел тестирование на чувствительность к рН
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 36 см

Другие сорта серии EYECONIC™:



EYECONIC™
Apricot



EYECONIC™
Peach



EYECONIC™
Cherry Blossom



EYECONIC™
Strawberry



EYECONIC™
Compact Sunset



EYECONIC™
Purple

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале



Время цветения

Весеннее / летнее
цветение



Ширина

30 - 36 см



Высота

30 - 36 см

Среднее время	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
5 недель	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1- 2 50 ppm азота	Опрыскивайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 ppm азота	в день посадки и неделя 2



Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно скорее



Применение К-ИВА может ускорить укоренение. Свет при размножении для оптимального роста и ускорения времени сбора урожая. Даминозид в концентрации от 1200 до 1500 ppm в день посадки. Баковая смесь даминозида и униказола-Р Неделя 3 для контроля вытягивания, если необходимо.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,2 - 5,8	0,80	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,2 до 5,8	0,80 до 0,90	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,2 до 5,8	0,90 до 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 ppm		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,2 до 5,8	1,0 до 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 ppm		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 5	5,2 до 5,8	1,0 до 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 ppm		Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ



EYECONIC™

Калибрахоа гибридная



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

- Прищипка по усмотрению
- Холодная температура в конце периода выращивания способствует лучшему качеству

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
От 7 до 8 недель 12 см горшок	Средняя дневная 18 ° - 20 °С	Прищипка не требуется Освещение не требуется	100 - 150 ppm азота	На стадиях саженца и созревания
От 8 до 9 недель 15 см	18 ° - 20 °С		Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 pH 5,5 до 6,0	
От 8 до 9 недель 20 см	3 растения на емкость			
От 8 до 9 недель 25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ



- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn)
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 6 Пересадка	5,6 до 6,0	1,0 до 1,2	18°-20° С	удобрение от 100 до 150 ppm	Дневное нейтральное	Даминозид по мере необходимости	Опрыскивайте фунгицидом после пересадки	
Неделя от 6 до 12	5,6 до 6,0	1,0 до 1,2	18°-20° С	удобрение от 100 до 150 ppm	Не требуется	Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm		Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm, когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

EYECONIC™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |  