

RAY™


Петуния гибридная



NEW 22



**Сорт Sunshine Improved
RAY™**



- Крупные цветы с насыпным габитусом подходят для выращивания в аккуратных корзинах или чудесных маленьких горшках
- Зацветает довольно рано для любого рынка
- Прищипка не требуется
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 36 см

Другие сорта серии RAY™:



Sunflower Imp. RAY™



Red improved RAY™



Fuchsia RAY™



Purple Vein RAY™



Sunshine RAY™



Black RAY™



Pistachio Cream RAY™



White RAY™



Blue Imp. RAY™



Purple RAY™

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

RAY™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

RAY™

Петуния гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале



Время цветения

Весеннее / летнее
цветение



Ширина

30 - 36 см



Высота

30 - 36 см

Среднее время	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1- 2 50 ppm азота	Опрыскивайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 ppm азота	в день посадки и неделя 2



Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно скорее



Сорта этой серии хорошо ветвятся, поэтому для качественного растения прищипка не требуется. Даминозид в концентрации 1500 ppm день спустя после посадки. Неделя 4 – баковая смесь даминозида в концентрации 2500 ppm / юниконазола в концентрации 10 ppm, если растения растут агрессивно.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении	Дополнительное освещение по усмотрению в зависимости от региона	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	Внесение аэрозольного удобрения
Неделя 2	5,6 до 6,0	0,80 до 0,90	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,6 до 6,0	0,90 до 1,0	Охладите до 20° C	Удобрение от 100 до 150 ppm				
Неделя 4	5,6 до 6,0	1,0 до 1,2	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm		Баковая смесь / даминозида / юниконазола, если необходимо		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

RAY™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



DANZIGER
www.danzigeronline.com |



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

- Поддерживайте более низкий уровень pH для оптимальной доступности железа (Fe) и марганца (Mn) для растений.
- Для лучшего качества больше всего подходит прохладная температура

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
От 6 до 7 недель	Средняя дневная	Прищипка не требуется	150 - 200 ppm азота	На стадиях саженца и созревания Даминозид в концентрации 2500 ppm / юниконазол в концентрации 10 ppm, если растения растут агрессивно
12 см горшок	20° - 22° C			
От 8 до 9 недель		Дополнительное освещение по усмотрению в зависимости от региона	Электропроводность почвы 1,2 - 1,5 pH 5,6 до 6,0	
15 см				
От 8 до 10 недель				
20 см	3 растения на емкость			
От 8 до 10 недель				
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ



- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn)
- Регулятор роста растений - Опрыскайте баковой смесью даминозида/юниконазола для регулирования высоты Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm для созревания, если необходимо

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,6 до 6,0	1,0 до 1,2	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm	Неприменительно	Баковая смесь/ даминозида/юниконазола, если необходимо	Опрыскайте фунгицидом после пересадки	
Неделя от 5 до 15	5,6 до 6,0	1,2 до 1,5	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm	Неприменительно	Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm		Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm, когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

RAY™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

