


VANESSA™

Вербена х гортензия



BRAND NEW 23



- Настоящий праздник цвета в розничных магазинах и в саду
- Прошла тестирование на устойчивость к мучнистой росе и стойкость окраски
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 25 см x 46 см

Сорт VANESSA™ Optik Grape

Другие сорта серии VANESSA™:



VANESSA™
Lime



VANESSA™
Bicolor Indigo



VANESSA™
Bicolor Pink



VANESSA™
Bicolor Purple



VANESSA™
Dark Pink



VANESSA™
Purple



VANESSA™
Red



VANESSA™
Violet



VANESSA™
White Improved

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

VANESSA™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

VANESSA™

Вербена х гортензия



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки – № 3 по 4-х балльной шкале



Время цветения

Весеннее / летнее
цветение



Ширина

36 – 51 см



Высота

25 - 36 см

Среднее время	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Не требуется	Недели 1- 2 50 ppm азота	Опрыскивайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 4 18° - 21° C		Недели 3-4 от 100 до 150 ppm азота	в день посадки и неделя 2



Спецификация орошения – уменьшите аэрозольное орошение как можно скорее



Обработайте растение адъювантом при посадке. Даминозид в концентрации 2000 ppm день спустя после посадки для получения отличного саженца прищипка не требуется

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении	Нейтральное	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	Внесение аэрозольного удобрения
Неделя 2	5,8 до 6,2	0,80 до 0,90	22° / 23° C	50 ppm азота в аэрозольном удобрении			Второе использова ние фунгицида	
Неделя 3	5,8 до 6,2	0,90 до 1,0	Охладите до 20°- 21° C	Удобрение от 100 до 150 ppm				
Неделя 4	5,8 до 6,2	1,0 до 1,2	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm		Даминозид по мере необходим ости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

VANESSA™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

VANESSA™

Вербена x гортензия



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

- Вербена хорошо реагирует на отрицательный DIF для контроля высоты
- Verbena Vanessa™ является раннецветущим растением

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
От 5 до 6 недель 12 см горшок	Средняя дневная 16° - 20° C	Прищипка не требуется Дневное нейтральное	150 - 200 ppm азота	Даминозид в концентрации 2500 ppm для созревания
От 6 до 7 недель 15 см			Электропроводность почвы 1,0 - 1,5 pH 5,8 до 6,2	Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm для созревания
От 7 до 8 недель 20 см	3 растения на емкость			
От 7 до 8 недель 25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ



- Регулятор роста растений - Опрыскайте даминозидом для контроля высоты/ Пропитка паклбутразолом для созревания
- Регулярно осматривайте на наличие трипсов

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

VANESSA™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

VANESSA™

Вербена x гортензия



Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,8 до 6,2	1,0 до 1,2	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm		Даминозид в концентрации 2500 ppm по мере необходимости	Смочите фунгицидом после пересадки	
Неделя от 5 до 12	5,8 до 6,2	1,2 до 1,5	18°-20° C	удобрение от 100 до 150 ppm		Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 ppm		Пропитка паклбутразолом, когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

VANESSA™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)

