


AMORE®

Петуния гибридная



AMORE® King of Hearts Imp.



- Оригинальный узор в форме сердца на каждом цветке
- Раннее цветение, насыпная форма роста
- Великолепно подходит для горшков, корзин и создания композиций
- Уникальный сорт, привлекателен как для розничного торговца, так и конечного потребителя
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 30 см x 30 см

Другие сорта серии AMORE®:



AMORE® Princess



AMORE® Queen of Hearts



AMORE® Pink Hearts



AMORE® Purple



Сорт AMORE® Heart & Soul



AMORE® Fluttering Heart



AMORE® Fiesta



AMORE® Joy

ТОЛЬКО
ЕС и остальные
страны

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

AMORE™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**



DANZIGER

www.danzigeronline.com |



AMORE®

Петуния гибридная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале



Время цветения

Весеннее / летнее
цветение



Ширина

36 – 46 см



Высота

30 – 36 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскивайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2



Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно раньше.



Сорта этой серии хорошо ветвятся, поэтому для качественного созревания прищипка не требуется. Даминозид в концентрации 1500 ч/млн день спустя после посадки. Неделя 4 – баковая смесь даминозида в концентрации 2500 ч/млн и юниконазола в концентрации 10 ч/млн, если растения растут агрессивно. Сорта Amore® Fiesta, Heart & Soul и Queen of Heart обладают самой высокой силой роста среди сортов серии.

Укоренение	pH	Электр опрово дность почвы	Темпера тура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Коммен тарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Дополнительное освещение по усмотрению, в зависимости от региона	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	
Неделя 2	5,6 - 6,0	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использова ние фунгицида	
Неделя 3	5,6 - 6,0	0,90 - 1,0	Охладите до 20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид @ в концентрации 2500 мг/л		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

AMORE™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |



AMORE®

Петуния гибридная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Поддерживайте более низкий уровень pH для оптимальной доступности железа (Fe) и марганца (Mn) для растений.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 7 недель 12 см горшок	Средняя дневная 20° - 22° C	Прищипка не требуется	100 - 150 мг/л азота	Стадия созревания Даминозид @ в концентрации 2500 to 3200 мг/л
8 - 9 недель 15 см		Дополнительное освещение по усмотрению, в зависимости от региона	Электропроводность почвы 1,2 - 1,5 pH 5,6 - 6,0	
8 - 10 недель 20 см	3 растения на емкость			
8 - 10 недель 25 см	3 растения на емкость			
Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС		
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД		
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН		
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ		
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ		



- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2500 до 3200 мг/л и/или пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания, если необходимо.

Созревание	pH	Электр. проводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Опрыскивание даминозидом	Опрыскивайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя от 5 до 15	5,6 - 6,0	1,2 - 1,5	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Неприменимо	Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л.		Пропитка паклбутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

AMORE™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



www.danzigeronline.com |