CAPELLA™

Петуния гибридная

CAPELLA™ Fuchsia Lace

- Идеальная петуния – хорошо подходит для размножения, выращивания в теплицах, А ТАКЖЕ ДЛЯ конечного потребителя
- Имеющий естественно регулируемую форму роста, сорт был выведен для выращивания в 12 см горшках, но петуния этого сорта легко заполнит и горшки большего размера
- Зацветает довольно рано для любого рынка
- Высота и ширина в зрелом возрасте: 25 см x 30 см

Другие сорта серии CAPELLA™:

CAPELLA™ Pink Morn

CAPELLA™ Magenta Diamond

CAPELLA™ Rim Raspberry

CAPELLA™ Salmon Imp.

CAPELLA™ Rim Fuchsia

CAPELLA™ Indigo Imp.

CAPELLA™ White Imp.

CAPELLA™ Ruby Red Imp.

CAPELLA™ Hello Yellow

CAPELLA™ Rose

CAPELLA™ Coral

CAPELLA™ Sangria

CAPELLA™ Baby Pink

CAPELLA™ Burgundy

CAPELLA™ Mulberry

CAPELLA™ Cherry Vanilla

CAPELLA™ Neon Pink

CAPELLA™ Pink Lace

CAPELLA™ Purple

CAPELLA™ Purple Veins

CAPELLA™ Salmon

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CAPELLA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

CAPELLA™

Петуния гибридная

СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 2 по 4-х балльной шкале

Время цветения	Ширина	Высота
Весеннее / летнее цветение	**20 – 25 см**	**25 - 36 см**

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2

Спецификация орошения– уменьшите аэрозольное орошение как можно раньше.

Сорта этой серии хорошо ветвятся, поэтому для качественного созревания прищипка не требуется. Даминозид в концентрации 1500 ч/млн день спустя после посадки. Неделя 4 - даминозид @ в концентрации 2000 to 2500 ч/млн

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,6 / 6,0	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Дополнительное освещение не требуется	Даминозид день спустя после посадки	День посадки	
Неделя 2	5,6 - 6,0	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,6 - 6,0	0,90 - 1,0	Охладите до 20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л				
Неделя 4	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Опрыскивание даминозидом в концентрации @ 2000 - 2500 мг/л		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CAPELLA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |

CAPELLA™

Петуния гибридная

СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Поддерживайте более низкий уровень pH для оптимальной доступности железа (Fe) и марганца (Mn) для растений.
- Для высококачественного созревания больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 7 недель	Средняя дневная 20°- 22° C	Прищипка не требуется Дополнительное освещение не требуется	150 - 200 мг/л азота	На стадиях саженца и созревания Даминозид в концентрации @ 2000 - 2500 мг/л
12 см горшок				
8 - 9 недель			Электропроводность почвы 1,2 - 1,5 pH 5,6 - 6,0	
15 см				
8 - 10 недель				
20 см	3 растения на емкость			
8 - 10 недель				
25 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ

- В зависимости от качества и щелочности воды может потребоваться дополнительное количество железа (Fe) или марганца (Mn).
- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2000 до 2500 ч/млн и/или пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания, если необходимо.

Созревание	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 4 Пересадка	5,6 - 6,0	1,0 - 1,2	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Непримемимо	Опрыскивание даминозидом	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя от 5 до 15	5,6 - 6,0	1,2 - 1,5	-	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Непримемимо	Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л		Пропитка паклобутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л, когда растения достигнут 85% от нужного размера

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

CAPELLA™ **НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ**

DANZIGER

www.danzigeronline.com |