


TIMELESS™ COLLECTION

Bidens ferulifolia



Blazing Flames™



- Minimum bis kein PGR nötig
- Das neue Blazing Star™ hat ein deutlich einprägsames Farbmuster
- Gut geeignet für Produktion in kleinen (12 cm) Behältern

KOMPAKT UND IN DIE HÖHE STREBEND



Blazing Embers™



Yellow Crown™

AUFGETÜRMT / HALBHÄNGEND



Yellow Splash Imp.™



Blazing Glory™



Yellow Charm™

IN DIE HÖHE STREBEND



Golden Empire™



White Delight™ Imp.



Pretty In Pink™ Imp.



Sunshine Double™



Blazing Star™

AUFGETÜRMT



Blazing Fire™



Blazing Ring of Fire™



Blazing Volcano™



Mega Charm™



Yellow Sunshine™

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

VANESSA™ **HIER KLICKEN**



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

TIMELESS™ COLLECTION

Bidens ferulifolia



Bewurzelungstips

- Steckpriorität 4 von 4



Blütezeit

Frühjahr / Sommer
Blüte



Breite

20 - 36 cm



Höhe

15 - 36 cm

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
4 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Nein	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 18 ° - 20 °C		3. - 5. Woche 100 bis 125 ppm N	Am Stecktag und in der 2. Woche



Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen



Breitbandfungizid am Stecktag anwenden um Blätterkrankheiten zu vermeiden.
Betreffend mehr robust wachsende Sorten, Daminozid-Spray 1500 ppm in Woche 3 anwenden

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel			Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	Auf 21 - 20 °C abkühlen	Düngung 100 ppm bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Daminozid nach Bedarf		

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

VANESSA™ **HIER KLICKEN**



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

TIMELESS™ COLLECTION

Bidens ferulifolia



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Stutzen ist optional
- Niedrige Temperaturen zum Kulturende erzielen die beste Qualität.

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
6 bis 8 Wochen 12 cm Topf	Durchschnittstag 18 ° - 20 °C	Stutzen wird nicht empfohlen Nicht notwendig - Tagesneutral	100 - 200 ppm N	DaminozidßSpray 1500 bis 2500 ppm
7 bis 9 Wochen 15 cm	1 ppm		Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,8 bis 6,2	
7 bis 9 Wochen 20 cm	3 ppm			
Pflanzenschädlinge	Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS		
	Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD		
Krankheiten	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN		
	Pythium	PROPAMOCARB		
	Phytophthora	PROPAMOCARB		
	Rhizoctonia	QUINTOZONE, TOLCLOFOS METHYL		



- PGR - Daminozid-Spray 1500 bis 2500 ppm kann ggf. für die Fertigstellung von Jungpflanzen und die Anwendung von Paclobutrazoldurchnässung 1 ppm für die Fertigstellung der lebhafteren Sorten notwendig sein.
- Für guten Luftzug sorgen und Pflanzen vor Nachteinbruch trocknen lassen Nach Topfen und dann wieder während der Fertigstellung zum Schutz gegen Rhizoctonia durchtränken.
- Nach Blasenfüßen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid 1500 ppm bis 2500 nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	
Woche 6 bis 12	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 200 ppm	Nicht notwendig	Mit 1 ppm Paclobutrazol abgießen		Mit Paclobutrazol 1 ppm abgießen wenn Pflanzen 85 % ihrer gewünschten Größe erreichen

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

BIDENS™ **HIER KLICKEN**



TIMELESS™ KOLLEKTION

BIDENS™

Bidens ferulifolia



Israel 2022



Konklin, 2022



Israel 2022



Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

BIDENS™ **HIER KLICKEN**



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   