


КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™

Черда ферулолистная



Blazing Flames™



- Практически не требуется применение регулятора роста растений
- Новый сорт Blazing Star™ обладает особым узором
- Хорошо подходит для выращивания в горшках 12 см

КОМПАКТНАЯ ПРЯМОРАСТУЩАЯ



Blazing Embers™



Yellow Crown™

НАСЫПНАЯ/ПОЛУСТЕЛЮЩАЯ



Yellow Splash Imp.™



Blazing Glory™



Yellow Canary

ПРЯМОРАСТУЩАЯ



Golden Empire™



White Delight™ Imp.



Blazing Fire™



Blazing Ring of Fire™



Pretty In Pink™ Imp.



Sunshine Double™



Blazing Star™



Blazing Volcano™



Mega Charm™



Yellow Sunshine™

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

BIDENS™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™

Черда ферулолистная



СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 4 по 4-х балльной шкале



Время цветения
Весеннее / летнее
цветение



Ширина
20 - 36 см



Высота
15 - 36 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° С	Нет	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскивайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки
	Недели 3 - 5 18° - 20° С		Недели 3 - 5 от 100 до 125 ч/млн азота	День посадки и неделя 2



Спецификация орошения – прекратите аэрозольное орошение как можно раньше.



Обработайте фунгицидом широкого спектра действия в день посадки для борьбы с болезнью листьев.

Для более рослых сортов опрыскивайте даминозидом в концентрации 1500 мг/л в неделю 3.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° С	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			День посадки	
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° С	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении			Второе использование фунгицида	
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° С	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		
Неделя 4	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° С	Удобрение от 100 до 150 мг/л		Даминозид по мере необходимости		

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

BIDENS™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ



DANZIGER

www.danzigeronline.com |

КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™

Черда ферулолистная



СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка по усмотрению, возможно на более сильные сорта
- Для высококачественного созревания и оптимальной окраски цветков больше всего подходит прохладная температура.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 8 недель 12 см горшок	Средняя дневная 18 ° - 20 °С	Прищипка - рекомендуется	100 - 200 мг/л азота Электропроводность почвы 1,0 - 1,2 рН 5,8 - 6,2	Даминозид в концентрации от 1500 до 2500 мг/л на более сильные сорта
7 - 9 недель				
15 см	1 ч/млн	Не требуется - растение нейтрального дня		
7 - 9 недель	3 ч/млн			
20 см				

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ
	Ризоктония	КВИНТОЦЕН, ТОЛКЛОФОС МЕТИЛ



- Регулятор роста растений - Опрыскивание даминозидом в концентрации от 1500 до 2500 ч/млн для молодых созревших растений - Пропитка паклбутразолом в концентрации 1 ч/млн для созревания, если необходимо для более сильных сортов.
- Обеспечьте постоянный приток воздуха и дайте растениям высохнуть до наступления темноты. Пропитайте растение для защиты от ризоктонии после пересадки и еще раз на стадии созревания.
- Регулярно осматривайте на наличие тли и трипсов.

Созревание	рН	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 5 Пересадка	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° С	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Не требуется	Даминозид по мере необходимости в концентрации от 1500 до 2500 мг/л	Опрыскивайте фунгицидом после пересадки	
Неделя 6 - 12	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° С	Удобрение от 100 до 200 ч/млн	Не требуется	Пропитка паклбутразолом в концентрации 1 мг/л, если необходимо.		Пропитка паклбутразолом в концентрации 1 ч/млн, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

BIDENS™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com | 

КОЛЛЕКЦИЯ TIMELESS™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

BIDENS™


Черда ферулолистная



Израиль, 2022



Конклин, 2022



Израиль, 2022



Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

[BIDENS™ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   