


COLLECTION TIMELESS™

Bidens ferulifolia



Blazing Flames™



- Ne nécessite que peu ou pas de régulateur
- La nouvelle Blazing Star™ a un motif de couleur bien délimité
- Bien adapté aux cultures en pots de 10,5 et 12 cm

ERIGE COMPACT



Blazing Embers™



Yellow Crown™

EN FORME BOULE/SEMI RETOMBANT



Yellow Splash Imp.™



Blazing Glory™



Yellow Charm™

PORT ERIGE



Golden Empire™



White Delight™ Imp.



Pretty In Pink™ Imp.



Sunshine Double™



Blazing Star™

EN FORME BOULE



Blazing Fire™



Blazing Ring of Fire™



Blazing Volcano™



Mega Charm™



Yellow Sunshine™

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

BIDENS™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

COLLECTION TIMELESS™

Bidens ferulifolia



CONSEILS DE PROPAGATION

- Piquer en priorité – Numéro 4 sur 4 catégories



Période de floraison

Printemps / Été
La floraison



Largeur

(8 - 14")
20 - 36 cm



Hauteur

(6 - 14")
15 - 36 cm

Temps moyen	Température	Hormone	Fertilisation	Fongicide
4 semaines	Semaines 1 - 2 21 ° - 22 °C	Non	Semaines 1-2 50 ppm N	Pulvériser un fongicide pour lutter contre Le Botrytis et les bactéries le jour du piquage
	Semaines 3 - 5 18 ° - 20 °C		Semaines 3 - 4 100 à 125 ppm	Jour du piquage et semaine 2



Spécifications de l'irrigation - Retirer la brumisation dès
que possible (jour 2 ou 3).



Appliquer un fongicide à large spectre le jour du piquage pour lutter
contre les maladies foliaires.

Pour les variétés les plus vigoureuses, appliquer une pulvérisation de
Daminozide à 1500 ppm semaine 3.

Enracinement	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	Régulateur	Fongicide	Commentaires
Semaine 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Jour du piquage	
Semaine 2	5,8 à 6,2	0,80 à 0,90	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Seconde application fongicide	
Semaine 3	5,8 à 6,2	0,90 à 1,0	Refroidir à 21° - 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm		Daminozide si nécessaire		
Semaine 4	5,8 à 6,2	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm		Daminozide si nécessaire		

Pour des informations supplémentaires sur la
culture technique:

BIDENS™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

COLLECTION TIMELESS™

Bidens ferulifolia



CONSEILS DE FINITION

- Pincement facultatif, éventuellement pour les variétés plus vigoureuses.
- Finition à température froide pour une meilleure qualité et une couleur de fleur optimale

Temps moyen (à partir de plantules)	Température	Retaille/ Modification de la longueur du jour	Fertilisation	Régulateur de croissance
6 à 8 semaines pot 12 cm	Temps moyen 18 ° - 20 °C	Pincement recommandé	100 - 200 ppm N	Daminozide à 1500 à 2500 ppm sur les variétés plus vigoureuses
7 à 9 semaines 15 cm	1 ppp	Non requis - Jour neutre	EC du sol 1,0 - 1,2 pH 5,8 à 6,2	
7 à 9 semaines 20 cm	3 ppp			

Nuisibles	Pucerons	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Larves	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Maladies	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB
	Rhizoctonia	QUINTOZONE, TOLCLOFOS METHYL

- Régulateur: Pulvérisation de Daminozide à 1500 à 2500 ppm sur les jeunes plantes en cours de finition - Application par brossage de Paclobutrazol à 1 ppm en cours de finition si nécessaire pour les variétés les plus vigoureuses.
- Maintenez une bonne circulation de l'air et laissez les plantes sécher avant la tombée de la nuit. Arrosage pour la protection contre le rhizoctone après la transplantation et de nouveau pendant la phase de finition.
- Dépister régulièrement les pucerons et les larves

Finitions	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	PGR	Fongicide	Commentaires
Semaine 5 Transplantation	5,8 à 6,2	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Pas nécessaire	Daminozide selon les besoins 1500 à 2500 ppm	Pulvériser un fongicide après transplantation	
Semaine 6 à 12	5,8 à 6,2	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 200 ppm	Pas nécessaire	Paclobutrazol Mouiller à 1 ppm si nécessaire		Paclobutrazol 1 ppm arroser lorsque les plantes ont atteint 85% de la taille désirée

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

BIDENS™ [CLIQUEZ ICI](#)



www.danzigeronline.com |

COLLECTION TIMELESS™

BIDENS™

Bidens ferulifolia



Israël, 2022



Konklin, 2022



Israël, 2022



Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

BIDENS™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   