


PHLOXSTAR™

Phlox drummondii



PHLOXSTAR™
Pink



- Phloxstar est la rockstar du jardin
- Testé pour enracinement facile
- Plante très robuste qui vont tenir tout l'été
- Hauteur et largeur à l'âge adulte 12 (30cm x 36cm).

D'autres de variétés dans la série PHLOXSTAR™:



Phloxstar™
White Imp.



Phloxstar™
Magenta



Phloxstar™
Red

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

PHLOXSTAR™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

PHLOXSTAR™

Phlox drummondii



CONSEILS DE MULTIPLICATION

- Piquer en priorité – Numéro 1 sur 4 catégories



Période de floraison

Printemps / Été
La floraison



Largeur

(14-16")
36 - 41 cm



Hauteur

(12 - 14")
30 - 36 cm

Temps moyen	Température	Hormone	Fertilisation	Fongicide
5 semaines	Semaines 1 - 2 21 ° - 22 °C	Recommandée	Semaines 1-2 50 ppm N	Pulvériser un fongicide pour lutter contre Le Botrytis et les bactéries le jour du piquage
	Semaines 3 - 5 18 ° - 20 °C		Semaines 3 - 5 100 à 150 ppm N	Pulvériser un fongicide pour contrôler le Botrytis et les bactéries Semaine 2



Spécification d'irrigation - Adjuvant de pulvérisation après piquage.



L'application de hormone IBA ou K-IBA peut accélérer l'enracinement. L'éclairage lors de la multiplication accélère la floraison - Interruption de nuit ou journée prolongée. Un pincement est recommandée la semaine précédant la transplantation ou au moment de la transplantation

Enracinement	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	Régulateur	Fongicide	Commentaires
Semaine 1	6,0 / 6,5	0,80	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation	Favorable		Jour du piquage	Engrais par brumisation
Semaine 2	6,0 à 6,5	0,80 à 0,90	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Seconde application fongicide	
Semaine 3	6,0 à 6,5	0,80 à 0,90	Refroidir à 21° - 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm				
Semaine 4	6,0 à 6,5	0,80 à 0,90	18 ° à 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm				
Semaine 5	6,0 à 6,5	0,9 à 1,0	18 ° à 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm		Daminozide selon les besoins à 1500 ppm	Pulvérisation pour la lutte contre l'oïdium	

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

PHLOXSTAR™ [CLIQUEZ ICI](#)



PHLOXSTAR™

Phlox drummondii



CONSEILS DE FINITION

- Pulvérisation pour la lutte contre l'oïdium
- Finition à basse température pour une meilleure qualité

Temps moyen (à partir de plantules)	Température	Pincement/ Modification de la longueur du jour	Fertilisation	Régulateur de croissance
7 à 8 semaines	Temps moyen	Pincement recommandé	100 - 150 ppm N	En plantules et aux stades finaux
12 cm pot	16 ° - 20 °C			
8 à 9 semaines	16 ° - 20 °C	Le Phlox d. profite des jours longs pour hâter la floraison	EC du sol 0,9 - 1,2 pH 6,0 à 6,5	
15 cm				
8 à 9 semaines				
20 cm	3 plantes par récipient			

Nuisibles	Pucerons	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
	Larves	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Maladies	Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
	Pythium	PROPAMOCARB
	Phytophthora	PROPAMOCARB



- Il est préférable que l'humidité du sol soit constante - laisser le sol sécher légèrement entre les irrigations
- Recherche de pucerons et d'aleurodes

Finitions	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	Régulateur	Fongicide	Commentaires
Semaine 6 Transplantat ion	6,0 à 6,5	0,9 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm		Daminozide si nécessaire	Pulvériser un fongicide après transplantation	Semaine 4 - Daminozide @ 2000 à 2500 ppm
Semaine 6 à 13	6,0 à 6,5	0,09 à 1,2	16 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Facultatif	Paclobutrazol Arrosage		Si les plantes poussent dans des conditions chaudes, application par bassinage de paclobutrazol à une concentration de 0,25 à 0,5 ppm

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

PHLOXSTAR™ [CLIQUEZ ICI](#)



www.danzigeronline.com | [YouTube](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#)