


# SOL SEEKER™

Гелиантус гибридный

Новинка  
2025



**SOL SEEKER™  
Bronze Burst**

- Естественно компактная форма роста
- Ограниченное применение регулятора роста растений
- Высота и ширина в зрелом возрасте
- Sol Seeker Bee Yellow – 91 см на 91 см
- Sol Seeker Bee Yellow – 91 см на 102 см
- Sol Seeker Honey – 102 см на 76 см
- Sol Seeker Bronze Burst – 110 см на 91 см

Другие сорта серии SOL SEEKER™:



**SOL SEEKER™  
Bee Yellow**



**SOL SEEKER™  
Golden Nectar**



**SOL SEEKER™  
Honey**

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL SEEKER™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



 **DANZIGER**  
www.danzigeronline.com | 

# SOL SEEKER™

Гелиантус гибридный

Новинка  
2025

## СОВЕТЫ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ

- Соблюдайте срочность посадки - № 3 по 4-х балльной шкале



Время цветения



Ширина



Высота

Весеннее / летнее

цветение

-

76 - 102 см

-

91 - 110 см

Средний срок	Температура	Гормон	Удобрение	Фунгицид
4 недели	Недели 1 - 2 21° - 22° C	По выбору	Недели 1 - 2 50 мг/л азота	Опрыскайте фунгицидом для борьбы с ботритисом и бактериями в день посадки.
	Недели 3 - 5 20° - 21° C		Недели 3-5 от 100 до 150 мг/л азота	День посадки и неделя 2



**Спецификация орошения**– уменьшите аэрозольное орошение ближе к вечерним часам, чтобы снизить уровень заболеваемости.

Опрыскайте фунгицидом широкого спектра действия через день после посадки и в 3-ю неделю (в т. ч. для борьбы с настоящей мучнистой росой).



Применение К-ИВА может ускорить укоренение. Даминозид в концентрации 1200 мг/л, неделя 4, непосредственно перед пересадкой.

Укоренение	pH	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 1	5,8 / 6,2	0,80	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Увеличьте световой день		День посадки	Увеличьте световой день до 12-14 часов
Неделя 2	5,8 - 6,2	0,80 - 0,90	22° / 23° C	50 мг/л азота в аэрозольном удобрении	Увеличьте световой день			
Неделя 3	5,8 - 6,2	0,90 - 1,0	Охладите до 20°-21° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Увеличьте световой день		Второе использование фунгицида	
Неделя 4	5,8 - 6,2	1,0 - 1,2	18°-20° C	Удобрение от 100 до 150 мг/л	Увеличьте световой день	Даминозид по мере необходимости		Прищипка при пересадке

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL SEEKER™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



DANZIGER

[www.danzigeronline.com](http://www.danzigeronline.com) |

# SOL SEEKER™

Гелиантус гибридный

Новинка  
2025

## СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ: СОВЕТЫ

- Прищипка при пересадке или через неделю после пересадки.
- Поддерживайте ночную температуру выше 18° С. Более низкие температуры приостановят рост растений, но развитие цветов продолжится.
- Более длинный световой день и высокие температуры ускорят рост.

Средний срок созревания (из саженцев)	Температура	Прищипка/ длина светового дня	Удобрение	Регулятор роста растений
6 - 8 недель 12 см горшок	Средняя дневная 65 °18 °С	Увеличьте световой день до 12 - 14 часов, если световой день длится меньше 12 часов.	150 - 200 мг/л азота	Опрыскивание даминозидом в концентрации от 2,000 до 2,500 ч/млн
8 - 9 недель 15 см	18 °С 1 растение на емкость		Электропроводность почвы 1,0 - 1,5 рН 5,7 - 6,3	
8 - 9 недель 20 см	3 растения на емкость			

Вредители	Тля	АЦЕТАМИПРИД, ФЛОНИКАМИД, ИМИДАКЛОПРИД, ДИХЛОРВОС
	Трипсы	МЕТИОКАРБ, АКРИНАТРИН, АБАМЕКТИН, ДИХЛОРОВОС, СПИНОСАД
Болезни	Ботритис	ЦИПРОДИНИЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ, ИПРОДИОН, ПОЛИОКСИН
	Питиозная гниль	ПРОПАМОКАРБ
	Фитофтора	ПРОПАМОКАРБ



- Опрыскайте для борьбы с настоящей мучнистой росой.
- Температура - ключевой фактор для поддержания правильного роста. Необходима температура выше 18° С.
- Увеличение светового дня до 12-14 часов при коротком световом дне.
- Регулярно осматривайте на наличие тли и трипсов.
- Пропитка почвы паклубутразолом в концентрации от 1 до 2 мг/л для созревания, если необходимо.

Созревание	рН	Электропроводность почвы	Температура	Удобрение	Освещение	Регулятор роста растений	Фунгицид	Комментарии
Неделя 6 Пересадка	5,7 - 6,3	1,0 - 1,2		Удобрение от 100 до 150 мг/л	См. выше	Даминозид по мере необходимости	Опрыскайте фунгицидом после пересадки.	
Неделя 6 - 13	5,7 - 6,3	1,0 - 1,5		Удобрение от 150 до 200 мг/л		Пропитка паклубутразолом в концентрации 1 мг/л		Пропитка паклубутразолом в концентрации 1 ч/млн, когда растения достигнут 85% от нужного размера.

Для получения дополнительной технической информации о выращивании:

SOL SEEKER™ [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ](#)



DANZIGER  
www.danzigeronline.com |